

## مقاله پژوهشی

# تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و تداومی با شدت متوسط بر میزان پلاسمایی Wnt3a و تعداد سلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

حمید داشمندی<sup>۱\*</sup>، اکبر اعظمیان جزی<sup>۲</sup>، بهنام قاسمی<sup>۲</sup>

## چکیده

**مقدمه:** نقش Wnt‌ها به عنوان واسطه‌های توسعه‌ی پانکراس تأیید شده است و تمرینات ورزشی ممکن است بر این فرآیند تأثیر داشته باشد. بنابراین هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و تداومی با شدت متوسط بر میزان پلاسمایی Wnt3a و تعداد سلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین است.

**روش‌ها:** ۲۴ سر رت به چهار گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، تمرین تداومی و مقاومتی با شدت متوسط تقسیم شدند. دیابت در اثر تزریق وریدی دوز ۱۱۰ میلی‌گرمی نیکوتین آمید و تزریق دوز ۴۰ میلی‌گرم استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش‌های صحرایی ایجاد شد. برنامه‌ی مداخلات ورزشی به مدت هشت هفته انجام گردید. Wnt3a و Wnt4 پلاسمایی به روش الیزا و تعداد سلول‌های بتا با روش هماتوکسین - اوزین ارزیابی شد.

**یافته‌ها:** تحلیل داده‌ها نشان داد که تعداد سلول‌های بتا در گروه‌های ورزشی نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی‌داری افزایش یافت ( $P < 0.05$ ). همچنین، تغییر معنی‌داری در میزان پلاسمایی Wnt3a و Wnt4 گروه‌های ورزشی نسبت به گروه کنترل سالم مشاهده گردید ( $P < 0.05$ ).

**نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد که هشت هفته تمرین تداومی با شدت متوسط و هشت هفته تمرین مقاومتی شدت متوسط احتمالاً باعث تکثیر و حفاظت سلول‌های بتا در پاسخ به افزایش Wnt3a و کاهش Wnt4 در رت‌های دیابتی می‌شود.

**واژگان کلیدی:** سلول‌های بتا، تمرین ورزشی، Wnt3a و Wnt4

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

۳- گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

\*نشانی: شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، کدپستی: ۱۴۱ ۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱، تلفن: ۰۳۲۳۲۴۴۰۱، پست الکترونیک: daneshmand@stu.sku.ac.ir

## مقدمه

پانکراس ایفا می‌کنند و قادر به القای تکثیر سلول‌های بتای پانکراس در شرایط آزمایشگاهی و داخل بدن هستند [۶]. مشخص شده است که دو پروتئین Wnt3a و Wnt4 توسط عضلات اسکلتی و بافت چربی سفید در طی توسعه‌ی مقاومت به انسولین ترشح می‌شود و نقش مهمی در تداخل بین بافت‌های مقاوم در برابر انسولین و سلول‌های بتا پانکراس دارد [۷]. فعال‌سازی سیگنال Wnt در جزایر پانکراس از طریق گردش خونی Wnt3a منجر به ترشح انسولین بیشتر و تسریع افزایش در سلول‌های بتا می‌شود، بنابراین منجر به انتباطی جزایر با نیازهای افزایش انسولین در یک وضعیت پیش دیابتی می‌شود [۷]. همچنین گزارش شده است که Wnt3a و Wnt4 مایوکاین‌های قوی هستند و میزان بیان و ترشح آنها می‌تواند در پاسخ به تغییرات تغذیه‌ای و متابولیکی تنظیم شود [۷]. Rulifson و همکاران (۲۰۰۷) به تازگی اثرات سیگنالینگ Wnt را در تنظیم ژن و تکثیر سلول‌های بتا با استفاده از هر دو روش درون و برون آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها عنوان کردند که Wnt3a تکثیر سلولی سلول‌های بتا را تحريك و تولید آکسین<sup>۳</sup> منجر به اختلال در گسترش سلول‌های بتا می‌شود [۸].

تمرينات ورزشی به عنوان مکمل در درمان دارویی، در مدیریت دیابت مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در انسان‌ها و حیوانات نشان داده‌اند که ورزش، مقاومت به انسولین را بهبود می‌بخشد [۹]، حساسیت انسولین را افزایش می‌دهد [۱۰، ۱۱]؛ استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد [۱۱] و از سلول‌های بتا حفاظت می‌کند [۱۱-۱۳]. Ranjbari و همکاران (۲۰۱۶) عنوان کردند که چهار هفته تمرين شنا همراه با مصرف عصاره گزنه به طور مؤثری باعث بهبود پارامترهای دیابتی و ترمیم بافت پانکراس در موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسمین در داخل بدن گردید [۱۴]. Maldonado و همکاران (۲۰۱۷) عنوان کردند هشت هفته تمرين دویden منجر به افزایش هیپرتروفی سلول‌های بتا می‌شود. آنها همچنین بیان کردند که تمرين شدت متوسط نسبت به تمرين با شدت بالا

دیابت یکی از شایع‌ترین اختلالات متابولیکی است که طبق آمار فدراسیون بین المللی دیابت<sup>۱</sup> افراد مبتلا به دیابت در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۲۵ میلیون نفر بوده است که پیش‌بینی شده است تا سال ۲۰۴۵ تعداد کل افراد مبتلا به دیابت به ۶۲۹ میلیون افزایش یابد [۱]. مطالعات نشان داده‌اند که کاهش تعداد سلول‌های بتا و نقص عملکرد سلول‌های بتا، در شیوع دیابت نوع یک و دو اهمیت ویژه‌ای دارد [۲] و عنوان شده است که ترشح ناکافی انسولین به‌واسطه تخریب سلول‌های بتای پانکراس در پاسخ به مقاومت انسولین طولانی مدت، با شیوع دیابت نوع دو و افزایش شدت این بیماری در افراد مبتلا همراه است [۳].

Stamateris و همکاران در سال ۲۰۱۶ عنوان کردند افزایش گلوکز خون از طریق سیگنالینگ انسولین منجر به افزایش تکثیر سلول‌های بتا می‌شود [۴]. این افزایش سلول‌های بتا منجر به افزایش ترشح انسولین برای جبران مقاومت به انسولین منجر می‌شود ولی برخلاف آن، مقاومت انسولینی شدید یا طولانی مدت در دیابتی‌ها، با کاهش تکثیر سلول‌های بتا و همچنین اختلال و کاهش در عملکرد سلول‌های بتا همراه است؛ در نتیجه، در پاسخ به مقاومت انسولینی طولانی مدت، تعداد و عملکرد سلول‌های بتا حفظ نمی‌شود [۳] که در نهایت به کاهش ترشح انسولین و افزایش غلظت گلوکز خون در جمعیت‌های مذکور منجر می‌شود.

مطالعات مربوط به همبستگی ژنوم تعداد چندین ژنوم را نشان داده است که حداقل چهارده مورد از این ژن‌ها در رشد و عملکرد جزایر پانکراس دخیل هستند. هفت عدد از این ژن‌ها جزء یا هدف مسیر سیگنالینگ<sup>۲</sup> Wnt هستند [۵]. پروتئین‌های Wnt گلیکوپروتئین‌های ترشحی هستند که به اعضای خاصی از خانواده گیرنده‌های Frizzled در سلول‌های هدف متصل می‌شوند. Wnt‌ها نقش مهمی را به عنوان واسطه‌های توسعه‌ی

<sup>1</sup> International Diabetes Federation

<sup>2</sup> Wingless-type mouse mammary tumor virus integration site family member

منجر به بازایی جزایر و احیا سلولی جزایر پانکراس آسیب دیده می شود [۲۰].

نتایج برخی از مطالعات بیانگر افزایش فعالیت مسیر Wnt ناشی از فعالیت بدنی و فشارهای مکانیکی وارد بر عضلهای اسکلتی هستند [۲۱، ۲۲]. نشان شده است که هشت هفته تمرینات قدرتی - توانی موجب افزایش فعالیت مسیر Wnt و بیان پروتئین بتا کاتنین در عضلهای اسکلتی می شود [۲۳]. همچنین، Wnt3a اجرای دو هفته دویden اختیاری باعث کاهش معنی دار Wnt9a و همچنین افزایش سطوح بتاکاتنین فسفوریله که از ملکولهای کلیدی مسیر Wnt و میلین سازی گردید [۲۴]. در تحقیق Fujimaki و همکاران (۲۰۱۴)، چهار هفته دویden اختیاری و با شدت آرام روی چرخ گردان موجب بیش تنظیمی مسیر Wnt و افزایش بتا کاتنین در گروه تمرین شد [۲۵]. Yang و همکاران (۲۰۱۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر تمرینات شنا بر مقاومت به انسولین از طریق مسیر سیگنالی Wnt3a/β-catenin در موش های دیابتی نوع دو پرداختند. آنها عنوان کردند که هشت هفته تمرینات شنا منجر به کاهش مقاومت به انسولین از طریق مسیر سیگنالی Wnt3a/β-catenin می شود [۹]. بعلاوه Pezhman و همکاران (۲۰۱۹) گزارش کردند که ۱۰ هفته تمرینات شنا می تواند تا حدودی تغییرات ناشی از دیابت در مسیر Wnt را از طریق تعديل اسکلروستین یا قند خون جبران کند [۲۶]. از طرفی، Vising و همکاران (۲۰۱۳) نیز عنوان داشتند که ۱۰ هفته تمرین استقامتی تغییر معنی داری در سطوح پایه پروتئین های پیام رسان بتاکاتنین و گلیکوژن ستاز کیناز ۳- بتا ایجاد نکرد [۲۷]. Amin و همکاران (۲۰۱۴) به این نتیجه رسیدند که متعاقب فعالیت ورزشی در موش های صحرایی تغییر معنی داری در میزان بیان پروتئین بتا کاتنین و Wnt3a مشاهده ایجاد نمی شود [۲۸].

در سال های اخیر، نقش سیگنال Wnt / β-catenin در چندین عملکرد حیاتی در جزایر پانکراس مشخص شده است. اول اینکه مشخص شده است که عدم تحمل گلوكز در موش های با نقص سیگنال Wnt استاندارد به واسطه حذف یا برداشت ژنتیکی گیرنده Wnt (Lrp5) است [۲۹]. دوم، نشان داده شده است که سیگنال Wnt / β-catenin در رشد و گسترش

منجر به افزایش بیشتری در تعداد سلول های بتا می شود [۱۳]. همچنین Shih and Kwok (۲۰۱۸) در تحقیقی گزارش کردند که ۱۲ هفته فعالیت ورزشی موجب افزایش ترشح انسولین و نیز بهبود عملکرد سلول های بتای پانکراس و حساسیت به انسولین می شود [۱۰]. Ghiasi و همکاران (۲۰۱۹) عنوان کردند ۱۲ هفته تمرین شنا با تأثیر بر بیان سیر توئین <sup>۱</sup> در پانکراس منجر به افزایش حساسیت انسولینی و حفاظت سلول های بتا از مرگ سلولی می شود [۱۱]. در حالی که در پژوهش Huang و همکاران در سال (۲۰۱۱)، شش هفته ورزش اختیاری در موش های دیابتی نوع یک، محتوا و ترشح انسولین را افزایش داد، اما در چگالی جزایر و تعداد سلول های بتا تغییری ایجاد نکرد [۱۵].

بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده اند که مسیر استاندارد سیگنالینگ  $\beta$ -catenin / Wnt در ستدرم متابولیک و بهویژه دیابت درگیر است و در هر دو محیط آزمایشگاهی و داخل بدن نقش مهمی در تولید انسولین و تنظیم پانکراس دارد [۱۷، ۱۶]. بتاکاتنین به عنوان هدف پایین دستی مهم در مسیر Wnt / TCF / LEF و دیگر ژن های سیگنالینگ را کنترل می کند. نشان داده شده است که مسیر سیگنالینگ  $\beta$ -catenin / Wnt رشد، تمایز و جابجایی سلول ها را تنظیم و کنترل می کند و بتا کاتنین که بیان ژن های هدف را فعال می کند اثرات مختلفی را در مراحل مختلف رشدی پانکراس موجب می شود [۱۸]. به عنوان مثال Wang و همکاران (۲۰۱۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیگنالینگ Wnt بر تمایز سلول های بتای پانکراس از سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی پرداختند. آنها عنوان کردند که سیگنال Wnt در تمایز سلول های بتا از سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی درگیر است. اما شواهد آشکاری مبنی بر درگیری پروتئین غیر فسفوریله بتاکاتنین در تمایز مشاهده نکردند [۱۹]. بعلاوه Figeac و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که فعال سازی STZ سیگنالینگ Wnt / β-catenin در رت های دیابتی شده با

<sup>۱</sup> Sirtuin 1

میانگین سنی شش هفته و میانگین وزنی  $8/9 \pm 230/08$  گرم انجام گرفت. شرایط نگهداری برای تمام گروه‌ها یکسان و به صورت ۱۲ ساعت تاریکی، ۱۲ ساعت روشنایی در دمای تقریبی ۲۰ تا ۲۳ درجه در فضاهای پلی‌کربنات ساخت شرکت انحصاری رازی راد با اندازه تقریبی  $54 \times 34 \times 21$  سانتی‌متر نگهداری شدند. آب و غذا (پلت ویژه موش) به طور آزادانه در دسترس تمام نمونه‌ها قرار داشت. پس از یک هفته آشناسازی رت‌ها با محیط و شرایط کلی آزمایشگاه، رت‌ها به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی شامل گروه کنترل سالم، گروه کنترل دیابتی، گروه تمرين یک (گروه تمرينی تداومی هشت هفته‌ای با شدت متوسط)، گروه تمرين دو (گروه تمرينی مقاومتی هشت هفته‌ای با شدت متوسط) تقسیم شدند.

### روش ایجاد دیابت

به منظور القای دیابت، پس از ۱۲ ساعت محرومیت رت‌ها از غذا، نیکوتین آمید - استرپیوزوتوسین محلول در بافر سیترات با  $pH: 4/5$  تزریق درون صفاقی گردید. به طوری که ابتدا نیکوتین آمید با دوز  $110$  میلی‌گرم بر هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شده و پس از  $15$  دقیقه استرپیوزوتوسین با دوز  $40$  میلی‌گرم بر هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شد. به رت‌های غیردیابتی نیز معادل حجمی بافر سیترات تزریق شد.  $72$  ساعت پس از تزریق، با ایجاد جراحت کوچکی توسط لانست بر روی ورید دمی رت‌ها، یک قطره خون بر روی نوار گلوکومتری قرار داده شد و نوار توسط دستگاه گلوکومتر خوانده شد و رت‌هایی که قند خون آنها مساوی یا بالاتر از  $mg/dL: ۲۰۰$  بود، به عنوان دیابتی در نظر گرفته شدند [۳۲].

### پروتکل‌های تمرين

آشناسازی رت‌ها با پروتکل‌های تمرينی یک هفته پس از القاء دیابت انجام شدند. بدین صورت که رت‌های گروه تمرين مقاومتی از نرdban پلکانی بدون هیچ مقاومتی در پنج جلسه تمرينی پیاپی بالا رفتند. همچنین رت‌های گروه تمرين تداومی

پانکراس اهمیت ویژه‌ای دارد [۵]. به علاوه نشان داده شده است که هورمون  $GLP-1^1$  موجب تحريك فعالیت  $Wnt$  در جزایر پانکراس موش بالغ می‌شود [۳۰] و هر دو  $TCF7L2^2$  و  $\beta\text{-cat}$  برای تحريك تکثیر سلولی  $GLP-1$  برای  $INS-1$  سلول بتای پانکراس موش مورد نیاز است [۳۱]. همه‌ی این اثرات به نقش سیگنال  $Wnt / \beta\text{-catenin}$  به عنوان یک تعیین کننده‌ی کلیدی توده‌ی سلول‌های بتا و ترشح انسولین اشاره دارد. از طرفی، به خوبی شناخته شده است که سیگنالینگ  $GSK3\beta^3$  و  $\beta\text{-catenin}$  توسط تمرينات ورزشی در عضلات اسکلتی انسان تنظیم می‌شود و بنابراین، اهمیت آنها را به عنوان واسطه‌های فرآیندهای متابولیکی و رونویسی تأکید می‌کند. علی‌رغم این یافته‌ها، اگرچه برخی مطالعات به بهبود سطوح انسولین و تکثیر سلول‌های بتا در پاسخ به تمرينات ورزشی طولانی مدت اشاره نموده‌اند [۱۳]، اما تاکنون هیچ مطالعه‌ای نقش مستقیم تمرينات ورزشی بر مسیر  $Wnt$  در پانکراس را در جمعیت‌های دیابتی بررسی نکرده است. بر پایه‌ی شواهد موجود، به نظر می‌رسد که تغییرات مسیر  $Wnt$  به واسطه‌ی مداخلات درونی یا محیطی با تکثیر یا بازسازی سلول‌های بتا یا سطح انسولین همراه باشد. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرينات مقاومتی و تداومی با شدت متوسط بر میزان پلاسمایی  $Wnt4$ ,  $Wnt3a$  و تعداد سلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی شده با استرپیوزوتوسین انجام گردید.

## روش‌ها

### نمونه و نوع تحقیق

پژوهش حاضر در کمیته‌ی اخلاق پژوهشگاه تربیت بدنی به شماره‌ی IR.SSRC.REC.1398.128 تصویب شده است. در تمامی مراحل کار، استانداردهای اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شدند. این تحقیق به صورت مطالعه‌ای تجربی بر روی  $24$  سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با

<sup>1</sup> Glucagon-like peptide-1

<sup>2</sup> Transcription factor 7-like 2

<sup>3</sup> glycogen synthase kinase-3β

تا حیوانات مورد مطالعه در کمترین زمان ممکن و با حداقل درد و آزار کشته شوند. بنابراین، رت‌ها با استفاده از زیلازین و کتامین بیهوش شدند. سپس با برش پوست در ناحیه شکم و قفسه سینه، از طریق باز کردن حفره‌ی شکمی، حدود ۱۰ میلی‌لیتر خون مستقیماً از قلب رت‌ها توسط سرنگ گرفته شد و به لوله‌ی آزمایش حاوی EDTA منتقل شد. سپس برای تهیه پلاسمای نمونه‌های جمع‌آوری شده به سرعت سانتریفیوژ (با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه و مدت ۱۰ دقیقه) گردید. Wnt3a و پلاسمایی و Wnt4 پلاسمایی با استفاده از کیت Wnt3a life Uscn و science inc ساخت کشور چین، محصول شرکت Wnt4 و به روش الیزا با استفاده از دستگاه الیزا ریدر آنالیز شد.

برای جلوگیری از تغییرات پس از مرگ و تغییرات خود تخریبی سلول‌های نواحی عمقی پانکراس، بافر فرمالین ۱۰٪ با عمل انتشار داخل رگی از طریق عروق خونی به پانکراس فرستاده شد تا ثبات مقدماتی روزی کل توده‌ی مغز بافت صورت گیرد و از تخریب سلول‌ها، در مراحل اولیه‌ی پس از مرگ جلوگیری به عمل آید. سپس ۵-۶ به روش تهیه مقاطع بافتی برش‌هایی به ضخامت میکرومتر تهیه و پس از آن این برش‌ها با روش هماتوکسین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. برای محاسبه‌ی تعداد سلول‌های بتا و پراکنده‌گی آنها تصویر پانکراس توسط عدسی شیء X ۴۰ با منفذ عددی ۲۵ توسط دوربین ویدئویی به صفحه‌ی مانیتور منتقل شد. ده میدان به صورت کاملاً تصادفی انتخاب و سلول‌های بتا در جزایر لانگرهانس شمارش شد.

### تجزیه و تحلیل آماری

ابتدا بهمنظور بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون شاپرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه‌ی بین گروهی از آزمون ANOVA یک سویه و در صورت معنی‌دار بودن تفاوت‌ها از آزمون تعقیبی شفه برای تعیین محل تفاوت‌ها استفاده شد. داده‌ها در سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS (نسخه

برای یک هفته بر روی تردیمیل با سرعت (۰/۳ km/h ، min/d ۱۰) دویدند. پس از مرحله آشناسازی، رت‌های گروه تجربی به مدت هشت هفته در تمرینات شرکت کردند.

### تمرین تداومی: (گروه تمرینی ۱)

پروتکل تمرین تداومی شدت متوسط شامل پنج جلسه در هفته برای هشت هفته انجام شد. به‌طوری که در چهار هفته ابتدایی، ۵ m/min برای پنج دقیقه، ۱۲ m/min برای پنج دقیقه و ۱۸ m/min برای ۲۰ دقیقه انجام شد. برای چهار هفته دوم پروتکل شامل ۱۰ m/min برای پنج دقیقه، ۱۶ m/min برای پنج دقیقه بعدی و ۲۲ m/min برای ۳۰ دقیقه انتهایی انجام شد [۳۳].

### تمرین مقاومتی: (گروه تمرینی ۲)

یک هفته بعد از القاء دیابت، حیوانات به مدت پنج روز متوالی قبل از آزمون حداکثر بار، با تمرینات آشنا شدند. آزمون شامل بار اولیه ۷۵ درصد وزن بدن بود. پس از اتمام اولین صعود، یک دوره استراحت دو دقیقه‌ای قبل از صعود بعدی در نظر گرفته شد. برای صعود بعدی بار با ۱۵، ۲۵ یا ۴۰ درصد از وزن بدن به ترتیب در هفته‌های اول، چهارم و هشتم پروتکل اعمال شد. این افزایش به‌طور متوالی تکرار شد تا حیوان نتواند در طول بارگیری (حداکثر شش صعود) صعود را کامل کند. پروتکل تمرینات ورزشی مقاومتی با استفاده از ارزش نرمال شده حداکثر بار برای هر موش صحرایی و با توجه به وزن بدن رت‌ها بارگیری شد. پروتکل تمرینات مقاومتی برای هشت هفته، پنج روز در هفته، با شدت متوسط (۴۰ تا ۶۰ درصد حداکثر بار [۳۴]), به عنوان توصیه شده برای افراد مبتلا به دیابت [۳۵]، با ۱۵ صعود در هر جلسه و یک فاصله‌ی زمانی یک دقیقه‌ای استراحت بین صعودها انجام شد.

### روش‌های آزمایشگاهی

همه‌ی حیوانات ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و متعاقب ۱۲ ساعت ناشتابی، طبق برنامه‌ی از پیش تعیین شده توسط متخصصین کار آزموده و با استفاده از شیوه‌ی مناسب بیهوش، کشته و جراحی شدند. در این تحقیق سعی بر آن بود


گروه‌های تمرين ۱ و ۲ موجب افزایش تعداد سلول‌های بتا نسبت به گروه کنترل دیابتی گردید ( $P=0.001$ ).

با توجه به نتایج جدول ۱، مشخص می‌شود که تفاوت معنی‌داری بین حداقل دو گروه در متغیرهای مورد بررسی وجود دارد. در ادامه برای بررسی اینکه کدام گروه‌ها با هم اختلاف معنی‌دار دارند از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج نشان داد بین گروه تمرين ۱ با کنترل سالم ( $P=0.001$ )، کنترل دیابتی ( $P=0.001$ ) و تمرين ۲ ( $P=0.004$ ) تفاوت معنی‌داری در سطوح پلاسمایی Wnt3a وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار بین گروه تمرين ۲ با گروه کنترل سالم ( $P=0.05$ ) است. به علاوه نتایج بیانگر تفاوت معنی‌دار در میانگین Wnt4 گروه کنترل سالم در مقایسه با گروه‌های کنترل دیابتی ( $P=0.001$ ) و تمرين ۱ ( $P=0.033$ ) و ۲ ( $P=0.001$ ) است. همچنین تفاوت معنی‌داری در میانگین گروه کنترل دیابتی در مقایسه با تمرين ۱ ( $P=0.001$ ) و گروه تمرين ۲ مشاهده گردید ( $P=0.002$ ).

۲۰) و برای ترسیم نمودارها از نرم‌افزار Excel (نسخه ۲۰۱۳) استفاده شد.


## یافته‌ها

میانگین وزن رت‌ها (نمودار ۱) در گروه‌های دیابتی (کنترل دیابتی، تمرين ۱ و ۲) نسبت به گروه کنترل سالم پس از هشت هفته تمرين کاهش معنی‌داری داشت ( $p<0.05$ ). اما اختلاف معنی‌داری بین میانگین وزن گروه‌های تمرين ۱ و ۲ با گروه کنترل دیابتی مشاهده نگردید. نتایج حاصل از شمارش تعداد سلول‌های بتای پانکراس (نمودار ۲) بیانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های تحقیق است ( $p<0.05$ ). همچنین، مشاهده گردید که استرپتوزوتونین موجب تخریب سلول‌های بتا در گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم می‌شود ( $P=0.001$ ). علاوه بر این، انجام هشت هفته تمرين در



نمودار ۱- تغییرات وزن در گروه‌های مختلف

\* تفاوت معنی‌دار با گروه کنترل سالم  $p < 0.05$



نمودار ۲- تغییرات تعداد سلول‌های بتا در گروه‌های مختلف بعد از ۸ هفته تمرین

\* تفاوت معنی دار با گروه کنترل سالم  $p < 0.05$ @ تفاوت معنی دار با گروه کنترل دیابتی  $p < 0.05$ 

جدول ۱- میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تمرینات بر Wnt3a پلاسمایی و Wnt4 پلاسمایی

متغیرها	کنترل سالم	کنترل دیابتی	تمرین ۱	تمرین ۲	مقدار F
Wnt3a (ng/ml)	۰/۴۵ ± ۰/۲۹	۱/۰۵ ± ۰/۲۸	۵/۷۴ ± ۲/۳۵	۲/۶۵ ± ۰/۷۲	۲۱/۶۱*
Wnt4 (ng/ml)	۰/۴۷ ± ۰/۱۸	۳/۳۴ ± ۰/۶۳	۱/۳۹ ± ۰/۵۲	۲/۰۷ ± ۰/۴۸	۳۶/۹۲*

\* وجود تفاوت معنی دار ( $P < 0.05$ ) بین گروه‌های مورد مطالعه

بهبود و افزایش عملکرد سلول‌های بتای پانکراس می‌شود

[۱۰].

از جمله دلایل احتمالی افزایش تعداد سلول‌های بتای پانکراس می‌توان به گیرنده سوبسترای انسولین دو<sup>۱</sup> اشاره کرد. عنوان شده است که پروتئین IRS-2 نقش مهمی در رشد و بقای سلول‌های بتا ایفا می‌کند و تنظیم مثبت آن در سلول‌های بتای پانکراس، به درمان دیابت در موش‌های دیابتی با STZ کمک می‌کند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که IRS-2 نقش مهمی در عملکرد سلول‌های بتا ایفا نماید [۱۳].

همچنین گزارش شده است که استرس اکسیداتیو ایجاد شده تحت شرایط دیابتیک، در پیشرفت اختلال عملکرد سلول‌های بتای پانکراس نقش دارد. به دلیل بیان نسبتاً کم آنزیم‌های آنتی اکسیدانی مثل کاتالاز و سوپر اکسید دیسماوتاز، سلول‌های بتای پانکراس ممکن است در برابر حمله‌ی رادیکال‌های آزاد

## بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین تداومی شدت متوسط و هشت هفته تمرین مقاومتی شدت متوسط منجر به افزایش تعداد سلول‌های بتا پانکراس رت‌های دیابتی شده با STZ گردید. نتایج تحقیق حاضر با نتایج Ranjbari و همکاران (۲۰۱۶) [۱۴]، Maldonado (۲۰۱۷) [۱۲] و Huang و همکاران (۲۰۱۹) [۱۱] همسو و با تحقیق Ghiasi و همکاران (۲۰۱۱) [۱۵] ناهمسو است. در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ در دانشکده‌ی طب ورزشی آمریکا و انجمن دیابت آمریکا به بیماران دیابتی نوع دو توصیه شده است که حداقل ۱۵۰ دقیقه تمرینات ورزشی با شدت متوسط و تمرینات مقاومتی با دو یا سه جلسه در هفته شرکت نمایند [۳۶]. به علاوه گزارش شده است که فعالیت ورزشی می‌تواند توده‌ی سلول‌های بتای پانکراس را افزایش دهد و به طور کلی موجب

<sup>1</sup> insulin receptor substrate -2 (IRS-2)

بررسی قرار دادند آنها به این نتیجه رسیدند که Wnt3a از طریق چرخه سلولی سیکلاین دی یک و دو<sup>۱</sup>، کیناز چهار واپسیه به سیکلاین<sup>۲</sup> و همچنین فاکتور رونویسی هومئودومین Pitx2<sup>۳</sup>، تکثیر سلولی را در سلول‌های بتای پانکراس تحریک می‌کند و در نهایت به افزایش ستز و ترشح انسولین منجر می‌شود [۸]. همچنین عنوان شده است که Wnt4 رشد سلول‌های بتا و ترشح انسولین با محرك Wnt3a را کاملاً مسدود می‌کند [۸].

همچنین Kozinski و همکاران (۲۰۱۶) نشان داده‌اند که Wnt4 و Wnt3a به طور خاص توسط عضله‌ی اسکلتی و بافت چربی در طی توسعه‌ی مقاومت به انسولین ترشح می‌شود و نقش مهمی در تداخل بین بافت‌های مقاوم در برابر انسولین و سلول‌های بتا پانکراس دارد [۷]. آن‌ها دریافتند که فعال‌سازی سیگنالینگ Wnt در جزایر پانکراس از طریق Wnt3a در گردش خون و تجمع بتا کاتنین متعاقب آن منجر به ترشح انسولین بالاتر و افزایش تکثیر سلول‌های بتا می‌شود و در نتیجه، منجر به انطباق جزایر با نیازهای افزایش انسولین در یک وضعیت پیش‌دیابتی می‌شود [۷]. به نظر می‌رسد این رخدادها توسط گیرنده FZD واسطه‌گری می‌شوند. همسو با نتایج تحقیق حاضر، این نتایج نشان می‌دهد که افزایش در ترشح Wnt4 و کاهش ترشح Wnt3a از بافت مقاوم به انسولین در طی توسعه‌ی دیابت ممکن است مانع پیشرفت بیماری از مرحله‌ی پیش‌دیابت به دیابتی شود.

همچنین Yang و همکاران (۲۰۱۷) طی تحقیقی به بررسی تأثیر تمرينات ورزشی شنا از طریق مسیر سیگنالی  $\beta$ -catenin بر مقاومت به انسولین در موش‌های دیابتی نوع دو پرداختند. آن‌ها عنوان کردند که هشت هفته تمرينات شنا منجر به کاهش مقاومت به انسولین از طریق مسیر سیگنالی Wnt3a/ $\beta$ -catenin می‌شود. همچنین، سطوح mRNA و پروتئین Wnt3a در موش‌های صحرابی دیابتی به‌طور قابل توجهی افزایش را افزایش می‌دهد، اما بیان GSK3 $\beta$  و بتاکتائین

آسیب‌پذیر باشند. فعالیت ورزشی می‌تواند آنزیم‌های آنتی اکسیدانی را افزایش دهد، استرس اکسیداتیو ایجاد شده در بافت پانکراس را کاهش دهد، از تخریب سلول‌های بتا جلوگیری کند و عملکرد و توده سلول‌های بتای پانکراس را بهبود دهد [۱۱].

همچنین فعالیت ورزشی می‌تواند سطوح سیتوکین‌های التهابی را کاهش داده و یا سطوح سیتوکین‌های ضد التهابی را افزایش دهد. همچنین می‌تواند از انباست سیتوکین‌های پیش التهابی روی پانکراس پیشگیری و از مرگ ناشی از سیتوکین در سلول‌های بتای جزایر پیشگیری کند [۳۷].

از طرفی عنوان شده است که حذف GLP-1 در سلول‌های پانکراس ایزوله شده انسان به افزایش آپوپتوز پانکراس منجر می‌گردد؛ در حالی که درمان با GLP-1 باعث کاهش آپوپتوز، افزایش تکثیر سلول‌های بتا می‌شود [۳۸]. طی تحقیقی در سال ۲۰۱۵ توسط Lee و همکاران گزارش کردند که ۱۲ هفته تمرين هوازی منجر به افزایش معنی‌دار GLP-1 در پسران نوجوان مبتلا به دیابت نوع دو می‌شود [۳۹]. همچنین عنوان شده است اتصال GLP-1 به گیرنده‌های GLP-1 منجر به فعال‌سازی فاکتور القایی ناشی از هیپوکسی ۱ آلفا<sup>۴</sup> با واسطه‌ی mTOR می‌گردد و در نهایت با افزایش عملکرد سلول‌های بتا منجر به افزایش ترشح انسولین می‌گردد [۴۰].

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرين تداومی با شدت متوسط منجر به افزایش معنی‌دار غلظت سرمی Wnt3a نسبت به گروه کنترل سالم و کنترل دیابتی گردید. همچنین هشت هفته تمرين مقاومتی با شدت متوسط منجر به افزایش معنی‌دار Wnt3a نسبت به گروه کنترل سالم گردید. علاوه بر این، هشت هفته تمرين تداومی و مقاومتی با شدت متوسط منجر به افزایش معنی‌دار Wnt4 نسبت به گروه کنترل سالم و کاهش معنی‌دار Wnt4 نسبت به گروه کنترل دیابتی گردید.

همسو با نتایج تحقیق حاضر، Rulifson و همکاران (۲۰۰۷) اثرات سیگنالینگ Wnt را در تنظیم ژن و تکثیر سلول‌های بتا با استفاده از هر دو روش برون و درون آزمایشگاهی مورد

<sup>2</sup> Cyclin D1 & D2

<sup>3</sup> Cyclin dependent kinase 4

<sup>4</sup> Homeodomain transcription factor Pitx2

<sup>1</sup> Hypoxia Inducible Factor 1 alpha (HIF-1 $\alpha$ )

بنا مطالعه‌ای انجام دادند. آنها نشان دادند که افزایش سیگنالینگ Wnt4 ناشی از رژیم غذایی پر چربی و پر ساکارز در سلول‌های بنا در تقویت ترشح انسولین ناشی از گلوکز و تخریب تکثیر سلولی سلول‌های بنا درگیر می‌شود. این نتایج به شدت نقش اساسی Wnt4 در تنظیم عملکردهای سلول‌های بنا در جزایر پانکراس موش را نشان می‌دهد [۴۱].

### نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که تعداد سلول‌های بنا در پاسخ به افزایش Wnt4 و کاهش Wnt3a متعاقب تمرینات ورزشی تداومی و مقاومتی با شدت متوسط افزایش می‌یابد. با این وجود، دستیابی به یک نتیجه‌گیری کلی، نیازمند مطالعات سلولی مولکولی بیشتری در این زمینه است. عدم اندازه‌گیری پروتئین بتاکاتینین از جمله محدودیت‌های تحقیق است. تغییرات Wnt‌ها منجر به جابجایی بتاکاتینین به درون هسته سلولی و بیان پروتئین‌های مختلف می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات بعدی مقادیر بیان ژن بتاکاتینین ارزیابی گردد.

### سپاسگزاری

بدین‌وسیله از کلیه‌ی کسانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

را به طور معنی‌داری تغییر نمی‌دهد. جالب توجه است که تنظیم Wnt3a موجب کاهش فعالیت فسفوریلاسیون GSK3 $\beta$  و کاهش مهار فسفوریلاسیون بتاکاتینین می‌شود که بیانگر بیان انسولین در سلول‌های بتای پانکراس است [۹]. در مطالعه Yang و همکاران، تمرینات ورزشی شنا با شدت کم، متوسط و با شدت زیاد موجب کاهش سطوح mRNA Wnt3a و پروتئین GSK3 $\beta$  را افزایش داد و همچنین، سطوح فسفوریلاسیون بتاکاتینین را در عضلات اسکلتی رت‌های دیابتی کاهش داد. نتایج آنها نشان داد که تمرینات ورزشی شنا می‌تواند فعال‌سازی مسیر Wnt /  $\beta$ -catenin در شرایط دیابت را تنظیم کند [۹].

Wnt4 به عنوان یک لیگاند غیر استاندارد شناخته شده است. سیگنال‌های Wnt غیر استاندارد شامل ترشح کلسیم از ER و افزایش ناشی از کلسیم داخل سلولی است که ممکن است باعث افزایش انسولین از سلول‌های بنا شود. با این حال، برای روشن شدن سازوکار دقیق عملکرد Wnt4 در سلول‌های بنا مطالعات بیشتری لازم است [۴۱]. هم‌سو با نتایج تحقیق ما عنوان شده است که در جزایر پانکراس، Wnt4 مانع واسطه‌گری Wnt3a در تکثیر و ترشح انسولین ناشی از گلوکز می‌شود. با این حال احتمالاً فراوانی Wnt4 در جزایر پانکراس و افزایش آن در پاسخ به مقاومت به انسولین حاکی از نقش احتمالی Wnt4 در جزایر پانکراس مستقل از Wnt3a است. چنانچه Kurita و همکاران (۲۰۱۹) تحقیقی با هدف بررسی اثرات رژیم غذایی پر چربی و پر ساکارز بر عملکرد جزایر پانکراس و رابطه آن با تغییرات بیان لیگاند Wnt در سلول‌های

### ماخوذ

1. Federation I. 2017. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2017.
2. Jiang WJ, Peng YC, Yang KM. Cellular signaling pathways regulating beta-cell proliferation as a promising therapeutic target in the treatment of diabetes. *Experimental and therapeutic medicine and biology* 2018; 16(4):3275-85.
3. Weir GC, Bonner-Weir S. Five stages of evolving beta-cell dysfunction during progression to diabetes. *Diabetes* 2004; 53 Suppl 3:S16-21.
4. Stamateris RE, Sharma RB, Kong Y, Ebrahimpour P, Panday D, Ranganath P, et al. Glucose Induces Mouse beta-Cell Proliferation via IRS2, MTOR, and Cyclin D2 but Not the Insulin Receptor. *Diabete*. 2016; 65(4):981-95.
5. Liu Z, Habener JF. Wnt signaling in pancreatic islets. *Advances in experimental medicine and biology* 2010;654:391-419.
6. Heiser PW, Lau J, Taketo MM, Herrera PL, Hebrok M. Stabilization of beta-catenin impacts

- pancreas growth. *Development (Cambridge, England)* 2006; 133(10):2023-32.
7. Kozinski K, Jazurek M, Dobrzyn P, Janikiewicz J, Kolczynska K, Gajda A, et al. Adipose- and muscle-derived Wnts trigger pancreatic beta-cell adaptation to systemic insulin resistance. *Scientific reports* 2016; 6:31553.
  8. Rulifson IC, Karnik SK, Heiser PW, ten Berge D, Chen H, Gu X, et al. Wnt signaling regulates pancreatic beta cell proliferation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2007; 104(15):6247-52.
  9. Yang Q, Wang WW, Ma P, Ma ZX, Hao M, Adelusi TI, et al. Swimming training alleviated insulin resistance through Wnt3a/beta-catenin signaling in type 2 diabetic rats. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences* 2017; 20(11):1220-6.
  10. Shih KC, Kwok CF. Exercise reduces body fat and improves insulin sensitivity and pancreatic beta-cell function in overweight and obese male Taiwanese adolescents. *BMC pediatrics* 2018; 18(1):80.
  11. Ghiasi R, Naderi R, Sheervalilou R, Alipour MR. Swimming training by affecting the pancreatic Sirtuin1 (SIRT1) and oxidative stress, improves insulin sensitivity in diabetic male rats. *Hormone molecular biology and clinical investigation* 2019; 40(3).
  12. Madsen SM, Thorup AC, Overgaard K, Jeppesen PB. High Intensity Interval Training Improves Glycaemic Control and Pancreatic beta Cell Function of Type 2 Diabetes Patients. *PloS one* 2015; 10(8):e0133286.
  13. Jimenez-Maldonado A, Virgen-Ortiz A, Melnikov V, Rodriguez-Hernandez A, Gamboa-Dominguez A, Montero S, et al. Effect of moderate and high intensity chronic exercise on the pancreatic islet morphometry in healthy rats: BDNF receptor participation. *Islets* 2017; 9(1):1-10.
  14. Ranjbari A, Azarbayjani MA, Yusof A, Halim Mokhtar A, Akbarzadeh S, Ibrahim MY, et al. In vivo and in vitro evaluation of the effects of *Urtica dioica* and swimming activity on diabetic factors and pancreatic beta cells. *BMC complementary and alternative medicine* 2016; 16:101.
  15. Huang HH, Farmer K, Windscheffel J, Yost K, Power M, Wright DE, et al. Exercise increases insulin content and basal secretion in pancreatic islets in type 1 diabetic mice. *Experimental diabetes research* 2011; 481427.
  16. Liu X, Chen D, Wu Z, Li J, Li J, Zhao H, et al. Ghrelin inhibits high glucose-induced 16HBE cells apoptosis by regulating Wnt/beta-catenin pathway. *Biochemical and biophysical research communications* 2016; 477(4):902-7.
  17. Wang J, Zhao J, Zhang J, Luo X, Gao K, Zhang M, et al. Association of Canonical Wnt/beta-Catenin Pathway and Type 2 Diabetes: Genetic Epidemiological Study in Han Chinese. *Nutrients* 2015; 7(6):4763-77.
  18. Schinner S. Wnt-signalling and the metabolic syndrome. *Hormone and metabolic research* 2009; 41(2):159-63.
  19. Wang H, Ren Y, Hu X, Ma M, Wang X, Liang H, et al. Effect of Wnt Signaling on the Differentiation of Islet beta-Cells from Adipose-Derived Stem Cells 2017; 2017:2501578.
  20. Figeac F, Uzan B, Faro M, Chelali N, Portha B, Movassat J. Neonatal growth and regeneration of beta-cells are regulated by the Wnt/beta-catenin signaling in normal and diabetic rats. *American journal of physiology Endocrinology and metabolism* 2010; 298(2):E245-56.
  21. Brack AS, Conboy MJ, Roy S, Lee M, Kuo CJ, Keller C, et al. Increased Wnt signaling during aging alters muscle stem cell fate and increases fibrosis. *Science (New York, NY)* 2007; 317(5839):807-10.
  22. Bu S, Chen Y, Wang S, Zhang F, Ji G. Treadmill training regulates beta-catenin signaling through phosphorylation of GSK-3beta in lumbar vertebrae of ovariectomized rats. *European journal of applied physiology* 2012; 112(9):3295-304.
  23. Leal ML, Lamas L, Aoki MS, Ugrinowitsch C, Ramos MS, Tricoli V, et al. Effect of different resistance-training regimens on the WNT-signaling pathway. *European journal of applied physiology* 2011; 111(10):2535-45.
  24. Zheng J, Sun X, Ma C, Li BM, Luo F. Voluntary wheel running promotes myelination in the motor cortex through Wnt signaling in mice. *Molecular brain* 2019; 12(1):85.
  25. Fujimaki S, Hidaka R, Asashima M, Takemasa T, Kuwabara T. Wnt protein-mediated satellite cell conversion in adult and aged mice following voluntary wheel running. *The Journal of biological chemistry* 2014; 289(11):7399-412.
  26. Pezhman L, Sheikhzadeh Hesari F, Ghiasi R, Alipour MR. Swim training affects bone canonical Wnt pathway in type 2 diabetes induced by high fat diet and low dose of streptozotocin in male rats. *Arch Physiol Biochem* 2019; 125(5):465-9.
  27. Vissing K, McGee S, Farup J, Kjolhede T, Vendelbo M, Jessen N. Differentiated mTOR but not AMPK signaling after strength vs endurance exercise in training-accustomed individuals. *Scandinavian journal of medicine & science in sports* 2013; 23(3):355-66.
  28. Amin H, Vachris J, Hamilton A, Steuerwald N, Howden R, Arthur ST. GSK3beta inhibition and LEF1 upregulation in skeletal muscle following a bout of downhill running. *The journal of physiological sciences: JPS* 2014;64(1):1-11.
  29. Fujino T, Asaba H, Kang MJ, Ikeda Y, Sone H, Takada S, et al. Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5) is essential for normal cholesterol metabolism and glucose-induced

- insulin secretion. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 2003; 100(1):229-34.
30. Liu Z, Habener JF. Stromal cell-derived factor-1 promotes survival of pancreatic beta cells by the stabilisation of beta-catenin and activation of transcription factor 7-like 2 (TCF7L2). *Diabetologia* 2009; 52(8):1589-98.
  31. Liu Z, Habener JF. Glucagon-like peptide-1 activation of TCF7L2-dependent Wnt signaling enhances pancreatic beta cell proliferation. *The Journal of biological chemistry* 2008; 283(13):8723-35.
  32. Somboonwong J, Traisaeng S, Saguanrungsirikul S. Moderate-intensity exercise training elevates serum and pancreatic zinc levels and pancreatic ZnT8 expression in streptozotocin-induced diabetic rats. *Life sciences* 2015; 139:46-51.
  33. Tine Kartinah N, Rosalyn Sianipar I, Nafi'ah, Rabia. The Effects of Exercise Regimens on Irisin Levels in Obese Rats Model: Comparing High-Intensity Intermittent with Continuous Moderate-Intensity Training. *BioMed Research International* 2018; 2018:4708287.
  34. Quinteiro H, Buzin M, Conti FF, Dias Dda S, Figueira D, Llesuy S, et al. Aerobic exercise training promotes additional cardiac benefits better than resistance exercise training in postmenopausal rats with diabetes. *Menopause* (New York, NY). 2015; 22(5):534-41.
  35. Sigal RJ, Armstrong MJ, Bacon SL, Boule NG, Dasgupta K, Kenny GP, et al. Physical Activity and Diabetes. *Canadian journal of diabetes* 2018; 42 Suppl 1:S54-s63.
  36. Dugan JA. Exercise recommendations for patients with type 2 diabetes. *JAAPA : official journal of the American Academy of Physician Assistants* 2016; 29(1):13-8;quiz 1.
  37. Teixeira-Lemos E, Nunes S, Teixeira F, Reis F. Regular physical exercise training assists in preventing type 2 diabetes development: focus on its antioxidant and anti-inflammatory properties. *Cardiovascular diabetology* 2011; 10:12.
  38. Christensen TF, Randlov J, Kristensen LE, Eldrup E, Hejlesen OK, Struijk JJ. QT Measurement and Heart Rate Correction during Hypoglycemia: Is There a Bias? *Cardiology research and practice* 2010; 961290.
  39. Lee SS, Yoo JH, So YS. Effect of the low- versus high-intensity exercise training on endoplasmic reticulum stress and GLP-1 in adolescents with type 2 diabetes mellitus. *Journal of physical therapy science* 2015; 27(10):3063-8.
  40. Carlessi R, Chen Y, Rowlands J, Cruzat VF, Keane KN, Egan L, et al. GLP-1 receptor signalling promotes beta-cell glucose metabolism via mTOR-dependent HIF-1alpha activation. *Sci Rep* 2017; 7(1):2661.
  41. Kurita Y, Ohki T, Soejima E, Yuan X, Kakino S, Wada N, et al. A High-Fat/High-Sucrose Diet Induces WNT4 Expression in Mouse Pancreatic beta-cells. *The Kurume medical journal* 2019; 65(2):55-62.

## **THE EFFECT OF EIGHT WEEKS OF MODERATE-INTENSITY RESISTANCE AND CONTINUOUS TRAINING ON PLASMA LEVELS OF WNT3A, WNT4, AND THE NUMBER OF BETA CELLS OF THE PANCREAS IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS**

Hamid Daneshmandi<sup>\*1</sup>, Akbar Azamian Jazi<sup>2</sup>, Behnam Ghasemi<sup>3</sup>

1. Department of Exercise Physiology, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2. Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

3. Department of Corrective Exercises and Sports Injury, Faculty of Humanities, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

### **ABSTRACT**

**Background:** The role of Wnts as mediators of pancreatic development has been confirmed, and exercise training may affect this process. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of eight weeks of resistance training and moderate-intensity training on plasma Wnt3a, Wnt4, and pancreatic beta-cell count in streptozotocin-induced diabetic rats.

**Methods:** Twenty-four rats were divided into four groups: healthy control, diabetic control, diabetic + moderate-intensity continuous training, and diabetic + moderate-intensity resistance training. Diabetes was induced by intravenous injection of 110 mg nicotinamide and 40 mg streptozotocin per kg of body weight. The exercise training intervention was performed for eight weeks. Plasma Wnt3a and Wnt4 were measured by the ELISA method, and the number of beta cells was assessed by hematoxylin-eosin.

**Results:** Data analysis showed that the number of beta cells in the exercise group increased significantly compared to the diabetic control group ( $P<0.05$ ). Also, a significant change was observed in the plasma levels of Wnt3a and Wnt4 in the exercise group compared to the healthy control group ( $P<0.05$ ).

**Conclusion:** It seems that eight weeks of moderate-intensity continuous training and eight weeks of moderate-intensity resistance training probably caused the proliferation and protection of beta cells in response to an increase in Wnt3a and a decrease in Wnt4 in the diabetic rats.

**Keywords:** Beta cells, Exercise, Wnt3a and Wnt4

---

\* Rahbar Bolvar, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Postal Code: 64165478, Tel: 03832324401, Email: daneshmand@stu.sku.ac.ir