

## متابولیت‌های اکسید نیتریک سرمی و هم‌گروهی اجزای سندرم متابولیک در اطفال: یک تحلیل عاملی اکتشافی

اصغر قاسمی<sup>۱</sup>، صالح زاهدی اصل<sup>۱\*</sup>، لیلا صید مردای<sup>۱</sup>، فریدون عزیزی<sup>۱</sup>

### چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی الگوی عوامل خطرزای سندرم متابولیک و ارتباط آن با متابولیت‌های سرمی اکسید نیتریک ( $\text{NO}_x$ ) در کودکان و نوجوانان است.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در ۸۵۱ کودک و نوجوان با دامنه سنی ۴ تا ۱۹ سال انجام شد. سندرم متابولیک بر اساس معیارهای تغییر یافته ATP III تعریف شد. برای بررسی الگوی عوامل خطرزای سندرم متابولیک از تحلیل عاملی استفاده شد.

یافته‌ها: شیوع سندرم متابولیک در پسران و دختران به ترتیب ۱۰/۸ و ۱۰/۰ درصد بود. غلظت سرمی  $\text{NO}_x$  در افراد مبتلا به سندرم متابولیک بعد از تعدیل سن و جنس بالاتر بود (۲۵/۲ در برابر ۲۷/۹  $\mu\text{mol/L}$ ،  $P=0/04$ ). تعداد افراد با سندرم متابولیک در پایین‌ترین چارک  $\text{NO}_x$  در مقایسه با چارک بالایی  $\text{NO}_x$  از ۶/۱ به ۱۳/۲ درصد افزایش یافت ( $P=0/014$ )؛ پس از تعدیل سن و جنس، شانس ابتلا به سندرم متابولیک در افرادی که در چارک بالایی  $\text{NO}_x$  قرار داشتند، بالاتر بود (نسبت شانس ۲/۲،  $P=0/029$ ). در کل جمعیت سه عامل فشار خون/چاقی، لیپید/چاقی و گلوکز/اکسید نیتریک شناسایی شد که توجیه کننده ۵۹/۹ درصد واریانس کل داده‌ها بود. تفکیک بر اساس جنس، مجدداً سه عامل را در هر جنس مشخص کرد، اما این بار  $\text{NO}_x$  در مردان در دو عامل وارد شده بود.

نتیجه‌گیری: متابولیت‌های سرمی اکسید نیتریک با سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان ارتباط دارد، علاوه بر آن در آنالیز بررسی هم‌گروهی عوامل خطر ساز متابولیکی،  $\text{NO}_x$  با اجزای دیگر سندرم متابولیک به ویژه قند خون ناشتا همراه گردید.

واژگان کلیدی: سندرم متابولیک، اکسید نیتریک، کودکان، نوجوانان

۱- مرکز تحقیقات غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

\*نشانی: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۴۰۹۳۰

نمبر: ۰۲۱-۲۲۴۰۲۴۶۳، پست الکترونیک: zahedi@endocrine.ac.ir

## مقدمه

سندرم متابولیک، مجموعه‌ای از عوامل خطر ساز متابولیکی برای ایجاد دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی - عروقی و بیماری مزمن کلیوی می‌باشد [۱،۲]. فرایند سندرم متابولیک در اوایل زندگی شروع و بعد از مدت طولانی بیماری ظاهر می‌شود و در تمام مدت کودکی و نوجوانی/بلوغ پایدار می‌ماند [۳،۴]. به علت شیوع فزاینده چاقی در دوران کودکی، شیوع سندرم متابولیک در اطفال در حال افزایش می‌باشد [۵]. سندرم متابولیک در کودکان، خطر ابتلا به آترواسکلروز اولیه، بیماری قلبی - عروقی و سندرم متابولیک بزرگسالی را افزایش می‌دهد [۵،۳]. به طور کلی سندرم متابولیک مجموعه‌ای از فشار خون، عدم تحمل گلوکز، چاقی و دیس لیپیدمی می‌باشد [۶]. پیشنهاد شده است که مقاومت به انسولین در اتیولوژی سندرم متابولیک نقش مهمی ایفا می‌کند؛ اما این موضوع هنوز قابل بحث می‌باشد [۷]. متغیرهای دیگر مانند نشانگرهای التهابی و فیبرینولیزی، پارامترهای هموستاتیک و افزایش اسید اوریک خون نیز به عنوان اجزای سندرم متابولیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۷-۹].

اکسید نیتریک (NO) در بسیاری از سیستم‌های بیولوژیک نقش مهمی ایفا می‌کند [۱۰،۱۱]. شواهد نشان می‌دهد که متابولیت‌های سرمی اکسید نیتریک ( $\text{NO}_x$ ) با اجزای سندرم متابولیک در بزرگسالان در ارتباط می‌باشد [۱۲،۱۳]. ارتباط معکوس بین مقاومت به انسولین و نقص عملکرد اندوتلیوم، سازوکار پاتوفیزیولوژیکی است که اختلالات متابولیک و هومئوستاز قلبی - عروقی را به هم مرتبط می‌کند و به آن سندرم متابولیک گفته می‌شود [۱۴]. شواهدی نشان می‌دهد که تولید بیش از حد NO، می‌تواند با ایجاد تغییرات پاتولوژیک منجر به مقاومت به انسولین گردد [۱۵-۱۷].

نگرانی‌ها درباره‌ی دوباره پیدایش سندرم متابولیک در کودکان در حال افزایش است و اطلاعات در مورد عوامل مرتبط با سندرم متابولیک در اطفال، می‌تواند به درک پاتوژنز این اختلال پیچیده کمک کند [۳]. براساس دانش ما، تا کنون مطالعه‌ای که ارتباط  $\text{NO}_x$  را با دیگر اجزای سندرم متابولیک با روش تحلیل عاملی<sup>۱</sup> گزارش کرده باشد، انجام

نشده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر ارزیابی همراهی<sup>۲</sup> عوامل خطر ساز قلبی - عروقی و سطح سرمی  $\text{NO}_x$  در کودکان و نوجوانان با روش تحلیل عاملی می‌باشد.

## روش‌ها

### افراد شرکت کننده در مطالعه

در یک مطالعه توصیفی - مقطعی، ۹۳۸ کودک و نوجوان با دامنه سنی ۴ تا ۱۹ که بین سال‌های ۸۵ تا ۸۶ در مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) شرکت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند [۱۸]. افراد دارای دیس لیپیدمی، مصرف کنندگان داروهای مدر و داروهای ضد اختلالات تیرویدی و همچنین افرادی که داده‌های لازم اجزای سندرم متابولیک را نداشتند، از مطالعه حذف شدند؛ لذا آنالیز داده‌ها بر روی ۸۵۱ نفر (۴۰۹ پسر و ۴۴۲ دختر) انجام شد. مطالعه قند و لیپید تهران به منظور تعیین عوامل خطر زای آترواسکلروز در جمعیت شهری تهران طراحی شده است. ۱۵۰۰۵ نفر فرد بزرگتر و مساوی ۳ سال از ساکنین منطقه ۱۳ تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جزئیات مربوط به طراحی و اهداف این مطالعه قبلاً منتشر شده است [۱۸]. طرح‌نامه مطالعه حاضر بوسیله کمیته اخلاق پژوهشگاه علوم غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید و از والدین و کودکان رضایت‌نامه کتبی جهت شرکت در مطالعه گرفته شد.

### اندازه‌گیری‌های آنروپومتریکی و بالینی

مصاحبه شخصی با هر فرد توسط افراد آموزش دیده و با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد انجام شد. وزن افراد با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۱۰۰ گرم در حالی که پوشش افراد حداقل بود و کفش نداشتند، اندازه‌گیری گردید. قد در حالت ایستاده بدون کفش، در حالی که شانه‌ها در وضعیت عادی بودند، اندازه‌گیری شد. نمایه توده بدنی (BMI) از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد

اندازه‌گیری شد. ضرایب تغییرات درون و برون سنجش هر دو ۰/۲٪ بود. برای اندازه‌گیری چربی‌های خون کیت‌های کلسترول تام (TC) و تری‌گلیسرید (TG) شرکت پارس آزمون (تهران - ایران) استفاده شد. اندازه‌گیری لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (HDL-C) بعد از رسوب لیپوپروتئین‌های حاوی آپولیپوپروتئین B با استفاده از اسیدفسفوتنگستیک انجام شد. غلظت لیپوپروتئین‌های با چگالی پایین با استفاده از فرمول فریدوالد محاسبه شد [۱۲]. ضریب تغییرات برون و درون سنجش در مورد کلسترول تام ۲ و ۰/۵ و در مورد تری‌گلیسرید ۱/۶ و ۰/۶ درصد بود. سنجش نمونه‌ها با استفاد از اوتوآنالیزر سلکترا ساخت کشور هلند انجام شد.

### تعریف متغیرها

سندرم متابولیک براساس معیارهای تغییر یافته ATP III [۶] به صورت حضور ۳ یا بیشتر از عوامل خطر زیر تعریف شد: تری‌گلیسرید بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ mg/dl سطح HDL-C کمتر از ۵۰ mg/dl (جز در پسرهای با دامنه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال که محدوده کمتر از ۴۵ mg/dl بود)، دور کمر بزرگتر یا مساوی صدک نودم برای سن و جنس، فشار خون سیستمی/دیاستولی بزرگتر یا مساوی صدک نودم برای سن، جنس و قد بر اساس حد ممیز توصیه شده سازمان بین المللی قلب، ریه و خون [۲۰] و قند خون ناشتا (FPG) بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ mg/dl چاقی و اضافه وزن براساس حد ممیزهای معرفی شده برای تعریف چاقی و اضافه وزن در کودکان (IOTF) تعریف شدند [۲۱].

### آنالیز آماری

آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۵) انجام شد و داده‌ها به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار بیان شده‌اند. به دلیل نامتقارن بودن توزیع داده‌های NO<sub>x</sub> و تری‌گلیسرید سرمی، لگاریتم آنها در آنالیز وارد شد و میانگین هندسی آنها (فاصله اطمینان ۹۵ درصد) گزارش گردید. مقادیر P کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار تلقی گردید. مقایسه بین زن و مرد با آزمون t مستقل انجام شد. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و

(برحسب متر) محاسبه شد. اندازه دور کمر (WC) در سطح ناف و دور لگن در پهن‌ترین قسمت با لباس سبک با استفاده از متر نواری غیر قابل ارتجاع، بدون فشار بر سطح بدن و با دقت ۰/۱ سانتی‌متر اندازه‌گیری شد و نسبت دور کمر به لگن (WHR) محاسبه گردید. فشار خون سیستمیک و دیاستولیک (SBP و DBP) افراد ۲ بار بعد از این که به مدت ۱۵ دقیقه استراحت کردند، با استفاده از فشارسنج جیوه‌ای استاندارد اندازه‌گیری شد و میانگین آن محاسبه گردید.

### اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی

بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتا بودن، یک نمونه خون از افراد گرفته شد و در مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه سانتریفوژ گردید. کلیه اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی در آزمایشگاه تحقیقاتی قند و لیپید تهران در همان روز نمونه‌گیری انجام شد. سطح سرمی NO<sub>x</sub> با استفاده از روش گریس [۱۹] که قبلاً گزارش شده است، اندازه‌گیری گردید. به طور خلاصه با اضافه کردن سولفات روی (۱۵mg/ml)، نمونه‌های سرمی پروتئین زدایی شدند و پس از ۱۰ دقیقه در ۱۰۰۰۰ دور سانتریفوژ شدند. ۱۰۰ میکرولیتر از فاز بالایی وارد یک چاهک میکروپلیت شد و ۱۰۰ میکرولیتر کلرید وانادیوم (III) (۸ mg/ml) به هرچاهک اضافه شد تا سبب احیای نیترات به نیتريت شود. سپس محلول گریس (مخلوط ۵۰ میکرولیتر سولفانیل آمید ۲ درصد و ۵۰ میکرولیتر N- نفتالین اتیلن دی آمین دی‌هیدروکلرید (NEDD) ۰/۱ درصد به هر چاهک اضافه شد. نمونه‌ها ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند و جذب نوری آنها در ۵۴۰ نانومتر با استفاده از دستگاه خوانشگر الیزا (Sunrise ساخت کمپانی Tecan اتریش) خوانده شد. غلظت نمونه‌های سرمی براساس منحنی استاندارد خطی که از غلظت‌های ۰ تا ۱۰۰ میکرومول در لیتر نیترات سدیم بدست آمده بود، محاسبه گردید. ضرایب تغییرات برون و درون سنجش این اندازه‌گیری به ترتیب ۰/۲/۵٪ و ۰/۴/۴٪ و بازیافت آن ۱/۵  $\pm$  ۹۳٪ بود.

گلوکز پلاسما با روش رنگ سنجی آنزیمی گلوکز اکسیداز و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون (تهران - ایران)

سندرم متابولیک (۳ عامل یا بیشتر) را داشتند. تعداد افراد با سندرم متابولیک در پایین‌ترین چارک سرمی  $\text{NO}_x$  (کمتر از ۱۹  $\text{mmol/L}$ ) در مقایسه با چارک بالایی آن (بیشتر یا مساوی ۳۰  $\text{mmol/L}$ ) از ۶/۱ درصد به ۱۳/۲ درصد افزایش یافت ( $P=0/014$ ). نسبت شانس ابتلا به سندرم متابولیک در افرادی که در چارک بالایی  $\text{NO}_x$  قرار داشتند، به طور معنی‌داری بالاتر بود (نسبت شانس ۲/۴ و فاصله اطمینان ۹۵ درصد ۱/۲-۴/۸،  $P=0/016$ )؛ این نسبت حتی پس از تعدیل سن و جنس، معنی‌دار بود (نسبت شانس ۲/۲ و فاصله اطمینان ۹۵ درصد ۱/۱-۴/۷،  $P=0/029$ ). غلظت سرمی  $\text{NO}_x$  در کودکان دارای سندرم متابولیک بعد از تعدیل سن و جنس در مقایسه با افراد بدون سندرم متابولیک به طور معنی‌داری بالاتر بود (۲۵/۲ در برابر ۲۷/۹  $\text{mmol/L}$ ،  $P=0/04$ ). همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، در این مطالعه سن دختران بالاتر بود، همچنین دختران دور کمر، نسبت دور کمر به دور لگن، فشار خون سیستولی و دیاستولی، قند خون ناشتا و غلظت  $\text{NO}_x$  پایین‌تر و کلسترول بالاتری در مقایسه با پسران داشتند. از اجزای سندرم متابولیک، شیوع  $\text{HDL}$  پایین در دختران بالاتر بود اما تفاوتی در دیگر متغیرها در دو جنس مشاهده نشد.

نتایج همبستگی بین متغیرهای پایه در جدول ۲ نشان داده شده است. سطح سرمی  $\text{NO}_x$  با فشار خون دیاستولی و نسبت دور کمر به دور لگن در مردان و با نسبت دور کمر به دور لگن در زنان ارتباط داشت. جدول ۳ نتایج مربوط به تحلیل عاملی متغیرهای متابولیکی و  $\text{NO}_x$  سرم را در کل جمعیت نشان می‌دهد.

سه عامل غالب که ۵۹/۹ درصد از واریانس مشاهدات را توصیف می‌کند، شناسایی شد. بارهای عاملی بعد از دوران واریماکس، نشان داد که اولین عامل (فشار خون/چاقی) با فشار خون سیستولی و دیاستولی، دور کمر و  $\text{BMI}$ ، دومین عامل (لیپید/چاقی) با تری‌گلیسرید،  $\text{HDL-C}$ ،  $\text{WC}$  و  $\text{BMI}$  و سومین عامل (گلوکز/ $\text{NO}_x$ ) با قند خون ناشتا و  $\text{NO}_x$  ارتباط دارد. جایگزین کردن نسبت دور کمر به دور لگن به جای دور کمر باعث هم‌خوشه‌ای قند خون ناشتا، نسبت دور کمر به دور لگن و  $\text{NO}_x$  در یک عامل در کل جمعیت شد (داده‌ها نشان داده نشده‌اند).

برای مقایسه تعداد افراد با سندرم متابولیک بین چارک پایین و بالای  $\text{NO}_x$ ، از آزمون مجذور کای استفاده گردید. جهت تعیین نسبت شانس ابتلا به سندرم متابولیک با فاصله اطمینان ۹۵ درصد بین چارک‌های پایین و بالای  $\text{NO}_x$ ، از رگرسیون لجستیک استفاده گردید.

تحلیل عاملی، یک روش خطی برای کاهش داده‌ها می‌باشد، که با اصول آنالیز اجزا انجام می‌شود. تحلیل عاملی از طریق کاهش متغیرهای وابسته به هم به صورت مجموعه کوچکتری از عوامل پنهان یا مستقل به تفسیر اساس فیزیولوژیکی و ساختار آماری سندرم متابولیک کمک می‌کند [۱]. تعداد عوامل بر مبنای مقادیر ویژه (Eigen value) تعیین شد (بزرگتر از یک). چرخش واریماکس<sup>۱</sup> جهت تعیین تعداد عوامل مستقل از هم استفاده گردید. نتایج الگوی عاملی<sup>۲</sup> براساس بارهای عاملی<sup>۳</sup> بیشتر یا مساوی ۰/۴ (و کمتر یا مساوی ۰/۴-) تفسیر شد. آنالیز اولیه با تعدادی از متغیرها شامل  $\text{BMI}$ ،  $\text{WC}$ ،  $\text{SBP}$ ،  $\text{DBP}$ ،  $\text{HDL-C}$ ،  $\text{TG}$  و  $\text{NO}_x$  انجام شد. سپس آنالیز به تفکیک گروه‌های سندرم متابولیک، چاقی و جنس انجام گردید.

جهت بررسی شدت ارتباط بین متغیرها و تایید انجام تحلیل عاملی از آزمون‌های کفایت نمونه (KMO) و بارتلت<sup>۴</sup> استفاده شد. مقادیر بیشتر از ۰/۶ آماره کیسره<sup>۵</sup> به عنوان شاخصی از کفایت نمونه‌ها و مفید بودن انجام تحلیل عاملی در نظر گرفته می‌شود. آزمون بارتلت این فرضیه را تست می‌کند که یک عامل برای توجیه اغلب واریانس موجود در نمونه‌ها کافی است؛ رد این آزمون نشان می‌دهد که فرضیه تک عاملی مخدوش است و تحلیل عاملی برای داده‌ها مناسب می‌باشد [۲۲]. در مطالعه حاضر تمام مقادیر  $P$  مربوط به آزمون بارتلت کمتر از ۰/۰۰۱ بود.

## یافته‌ها

از ۸۵۱ کودک و نوجوان با دامنه سنی ۴ تا ۱۹ سال، ۲۳/۱ درصد فاقد عامل سندرم متابولیک بودند در حالی که ۴۱/۵ درصد یک عامل، ۲۵/۰ درصد دو عامل و ۱۰/۳ درصد

- 1- Varimax rotation
- 2- Factor pattern
- 3- Factor loadings
- 4- Bartlett's
- 5- Kaiser

نتایج حاصل از تحلیل عاملی در گروه‌های سندرم متابولیک در جدول ۵ نشان داده شده است. در افراد با یا بدون سندرم متابولیک، ۴ عامل حضور دارند؛ اما در افراد با سندرم متابولیک،  $NO_x$  به قند خون ناشتا اضافه شده است در حالی که در افراد بدون سندرم متابولیک،  $NO_x$  به عنوان یک عامل مستقل عمل می‌کند. در کودکان مبتلا به افزایش وزن یا چاقی،  $NO_x$  در عامل سوم با BMI و قند خون ناشتا همراه شد که ۱۴/۶۲ درصد از واریانس کلی را شامل می‌شود، در حالی که در افراد با وزن طبیعی،  $NO_x$  به عنوان یک عامل مستقل، بار مثبت قوی در عامل ۴ دارد (جدول ۶).

الگوی عامل‌ها بین مردان و زنان تفاوت‌هایی نشان داد. برای اولین عامل در مردان، دور کمر، تری‌گلیسرید و BMI، بار مثبت و HDL-C، بار منفی داشت؛ در حالی که در زنان، فشار خون سیستولی و دیاستولی، دور کمر و BMI بار مثبت داشتند. برای عامل دوم، در مردان، فشار خون سیستولی و دیاستولی بار مثبت و  $NO_x$  بار منفی داشت؛ در حالی که در زنان، تری‌گلیسرید، بار قوی مثبت و HDL-C، بار منفی داشت. در هر دو جنس، قند خون ناشتا و  $NO_x$  در سومین عامل بارگیری شدند، با این تفاوت که  $NO_x$  در مردان بار منفی و در زنان بار مثبت داشت. در زنان هر متغیر فقط در یک عامل وارد شد در حالی که در مردان فشار خون سیستولی و  $NO_x$  در دو عامل بارگیری شدند (جدول ۴).

جدول ۱ - مشخصات پایه افراد شرکت کننده در مطالعه

شاخص	مرد	زن
تعداد	۴۰۹	۴۴۲
سن (سال)	۱۲ ± ۴	۱۳ ± ۴*
نمایه توده بدنی ( $kg/m^2$ )	۲۰/۵ ± ۸/۱	۲۰/۴ ± ۴/۶
اندازه دور کمر (سانتی متر)	۷۱/۶ ± ۱۴/۳	۶۶/۷ ± ۱۱/۲*
نسبت دور کمر به قد (درصد)	۱۰/۳	۱۲/۲
نسبت دور کمر به دور باسن	۰/۸۸ ± ۰/۰۶	۰/۷۸ ± ۰/۰۷*
فشار خون سیستولیک (mmHg)	۱۰۲ ± ۱۲	۹۷ ± ۱۲*
فشار خون دیاستولیک (mmHg)	۶۵/۳ ± ۱۰/۵	۶۲/۶ ± ۹/۷*
فشار خون بالا (درصد)	۱۰/۸	۷/۵
قند خون ناشتا (mg/dl)	۸۷ ± ۶	۸۵ ± ۶*
قند خون ناشتای بالا (درصد)	۳	۲
تری‌گلیسرید سرمی (mg/dl)	۸۴ (۸۱-۸۸)	۸۶ (۸۳-۹۰)
تری‌گلیسرید سرمی بالا (درصد)	۳۴	۳۳
کلسترول تام سرمی (mg/dl)	۱۵۴/۸ ± ۲۷/۴	۱۵۸/۶ ± ۲۸/۱*
HDL سرمی (mg/dl)	۴۵ ± ۱۱	۴۵ ± ۹
HDL سرمی پایین (درصد)	۶۳/۳	۷۰/۴*
غلظت سرمی متابولیت‌های اکسید نیتریک ( $\mu mol/L$ )	۲۷/۱ (۲۵/۹-۲۸/۴)	۲۴/۷ (۲۳/۶-۲۵/۸)*
سندرم متابولیک (درصد)	۱۰/۸	۱۰/۰
وضعیت نمایه توده بدنی †	۲۱/۳	۱۹/۵
افزایش وزن (درصد)	۷/۳	۷/۵
چاقی (درصد)		

نوع مطالعه توصیفی - مقطعی بوده و داده‌ها به صورت میانگین ± انحراف معیار یا درصد بیان شده‌اند، در مورد تری‌گلیسرید و متابولیت‌های اکسید نیتریک میانگین هندسی ارائه شده است، مقادیر داخل پرانتز فاصله اطمینان ۹۵ درصد را نشان می‌دهد. برای مقایسه متغیرهای کمی و کیفی بین دو گروه به ترتیب از آزمون‌های t مستقل و مجذور کای استفاده شد.

\*:  $P < 0.05$

† با استفاده از حد ممیز (International Obesity Task Force) IOTF.

جدول ۲- ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پایه بین ۴۰۹ پسر (بالای خط اریب) و ۴۴۲ دختر (زیر خط اریب)

دختر/پسر								
متابولیت‌های اکسیدنیتریک	نسبت دور کمر به دور باسن	دور کمر	نمایه توده بدنی	HDL	تری گلیسرید	قند خون ناشتا	فشار خون دیاستولیک	فشار خون سیستولیک
-۰/۰۷	*۰/۱۰	‡۰/۵۳	‡۰/۲۷	‡-۰/۲۴	‡۰/۲۸	۰/۰۳	‡۰/۵۶	فشار خون سیستولیک
*-۰/۱۰	۰/۰۱	‡‡۰/۲۹	‡۰/۱۸	‡-۰/۱۷	‡۰/۱۸	۰/۰۶		‡۰/۴۴ فشار خون دیاستولیک
۰/۰۱	*۰/۱۱	‡۰/۱۴	-۰/۰۱	-۰/۰۲	‡۰/۱۶		*۰/۰۹	‡۰/۱۲ قند خون ناشتا
-۰/۰۵	‡۰/۳۳	‡۰/۵۱	‡۰/۲۶	‡-۰/۴۱		‡۰/۲۴	۰/۰۶	‡۰/۱۲ تری گلیسرید
-۰/۰۲	‡-۰/۱۷	‡-۰/۴۴	‡-۰/۲۴		‡-۰/۳۳	-۰/۰۶	۰/۰۲	۰/۰۱ HDL
-۰/۰۱	‡۰/۲۳	‡۰/۴۹		‡-۰/۱۶	‡۰/۲۲	‡۰/۱۴	‡۰/۲۸	‡۰/۳۴ نمایه توده بدنی
-۰/۰۵	‡۰/۴۵		‡۰/۹۲	‡-۰/۱۹	‡۰/۲۵	‡۰/۱۵	‡۰/۲۸	‡۰/۳۶ دور کمر
*۰/۱		*۰/۰۹	-۰/۰۲	*-۰/۰۸	‡۰/۱۶	۰/۰۸	*-۰/۰۹	-۰/۰۵ نسبت دور کمر به دور باسن
	‡۰/۱۴	۰/۰۲	۰/۰۲	-۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۶	۰/۰۶ متابولیت‌های اکسید نیتریک

\*: P<۰/۰۵, †: P<۰/۰۱, ‡: P<۰/۰۰۱

جدول ۳- بار عاملی برای متغیرهای اصلی با عوامل دوران یافته در کل افراد (تعداد= ۸۵۱)

عوامل		
عامل ۱	عامل ۲	عامل ۳
‡۰/۸۲۶	۰/۱۱۷	۰/۰۸۹
۰/۸۱۵	-۰/۰۴۱	۰/۰۰۸
۰/۰۵۲	‡۰/۷۴۵	۰/۱۶۷
۰/۰۴۱	-۰/۷۴۱	۰/۰۰۶
۰/۰۲۸	۰/۲۱۸	‡۰/۶۶۱
‡۰/۵۶۴	‡۰/۶۲۸	۰/۰۳۵
‡۰/۴۶۰	‡۰/۵۲۹	-۰/۱۱۲
۰/۰۲۶	۰/۱۱۶	‡۰/۷۵۱
۲۳/۵۸	۲۳/۱۹	۱۳/۱۴
۲۳/۵۸	۴۶/۷۷	۵۹/۹۰

فشار خون سیستولیک (mmHg)

فشار خون دیاستولیک (mmHg)

تری گلیسرید سرمی (mg/dl)

HDL سرمی (mg/dl)

قند خون ناشتا (mg/dl)

اندازه دور کمر (سانتی متر)

نمایه توده بدنی (kg/m<sup>2</sup>)

غلظت سرمی متابولیت های اکسید نیتریک (µmol/L)

واریانس تعیین شده (درصد)

واریانس کلی (درصد)

بارهای عاملی بیشتر یا مساوی ۰/۴ (و کمتر یا مساوی -۰/۴) با علامت (‡) مشخص شده‌اند که با استفاده از روش تحلیلی عاملی به دست آمده است.

جدول ۴- بار عاملی برای متغیرهای اصلی با عوامل دوران یافته در کودکان طرح قند و لیپید تهران بر اساس جنس

پسر (تعداد=۴۴۲)			دختر (تعداد=۴۰۹)			
عامل ۳	عامل ۲	عامل ۱	عامل ۳	عامل ۲	عامل ۱	
۰/۳۶۰	-۰/۱۵۹	‡۰/۶۷۰	-۰/۰۶۹	‡۰/۶۸۸	‡۰/۴۴۸	فشار خون سیستولیک (mmHg)
۰/۳۸۸	-۰/۲۴۱	‡۰/۶۰۸	۰/۱۹۲	‡۰/۷۷۰	۰/۲۲۱	فشار خون دیاستولیک (mmHg)
۰/۲۳۰	‡۰/۷۲۹	۰/۱۳۳	۰/۳۱۱	۰/۰۹۰	‡۰/۶۹۲	تری گلیسرید سرمی (mg/dl)
۰/۰۲۵	‡۰/۷۴۹	-۰/۰۰۳	۰/۰۰۹	-۰/۰۰۷	‡-۰/۷۰۳	HDL سرمی (mg/dl)
‡۰/۵۰۰	۰/۳۵۶	۰/۱۰۳	‡۰/۸۰۹	-۰/۱۵۹	۰/۱۵۹	قند خون ناشتا (mg/dl)
-۰/۱۶۵	۰/۳۳۸	‡۰/۸۵۹	۰/۱۳۳	۰/۳۰۳	‡۰/۷۸۸	اندازه دور کمر (سانتی متر)
-۰/۱۷۹	۰/۳۱۰	‡۰/۸۵۹	-۰/۱۳۳	۰/۱۵۵	‡۰/۶۰۶	نمایه توده بدنی (kg/m <sup>2</sup> )
‡۰/۶۷۷	۰/۰۳۹	-۰/۰۴۰	‡-۰/۴۸۸	‡-۰/۵۸۵	۰/۲۷۷	غلظت سرمی متابولیت های اکسید نیتریک (μmol/L)
۱۳/۷۷	۱۸/۹۴	۲۹/۰۵	۱۳/۳۴	۱۹/۴۶	۲۸/۹۳	واریانس تعیین شده (درصد)
۶۱/۷۶	۴۷/۹۹	۲۹/۰۵	۶۱/۷۳	۴۸/۳۸	۲۸/۹۳	واریانس کلی (درصد)

بارهای عاملی بیشتر یا مساوی ۰/۴ (و کمتر یا مساوی -۰/۴) با علامت (‡) مشخص شده اند که با استفاده از روش تحلیلی عاملی به دست آمده است.

جدول ۵- بار عاملی برای متغیرهای اصلی با عوامل دوران یافته در کودکان طرح قند و لیپید تهران بر اساس سندرم متابولیک

افراد با سندرم متابولیک (تعداد=۸۸)				افراد بدون سندرم متابولیک (تعداد=۷۶۳)				
عامل ۴	عامل ۳	عامل ۲	عامل ۱	عامل ۴	عامل ۳	عامل ۲	عامل ۱	
-۰/۲۲۱	‡۰/۷۴۲	۰/۱۵۰	۰/۱۳۵	۰/۰۱۶	۰/۱۱۵	۰/۰۴۲	‡۰/۸۳۰	فشار خون سیستولیک (mmHg)
۰/۱۵۷	‡۰/۸۱۳	۰/۰۲۵	۰/۰۱۶	-۰/۰۶۴	-۰/۰۲۰	-۰/۰۷۶	‡۰/۷۹۲	فشار خون دیاستولیک (mmHg)
۰/۱۴۲	-۰/۱۳۹	‡-۰/۸۳۹	-۰/۰۱۱	-۰/۱۲۵	۰/۲۹۷	‡۰/۶۹۷	-۰/۰۰۹	تری گلیسرید سرمی (mg/dl)
۰/۱۷۴	۰/۰۱۵	‡۰/۸۲۳	-۰/۱۲۹	-۰/۰۵۵	۰/۰۸۵	‡-۰/۷۵۸	۰/۰۴۶	HDL سرمی (mg/dl)
۰/۷۳۳	-۰/۳۲۵	۰/۰۴۶	۰/۰۶۶	۰/۰۳۲	۰/۹۴۵	۰/۰۴۷	۰/۰۶۶	قند خون ناشتا (mg/dl)
-۰/۱۲۲	۰/۱۵۱	-۰/۲۰۹	‡۰/۸۸۰	۰/۰۴۴	۰/۰۸۳	‡۰/۵۶۸	‡۰/۵۹۹	اندازه دور کمر (سانتی متر)
۰/۰۰۱	-۰/۰۰۳	۰/۰۵۷	‡۰/۹۳۹	۰/۰۶۴	-۰/۲۲۰	‡۰/۵۰۷	‡۰/۴۶۵	نمایه توده بدنی (kg/m <sup>2</sup> )
‡۰/۶۹۶	۰/۲۸۷	-۰/۰۱۲	-۰/۱۸۷	‡۰/۹۸۹	۰/۰۲۴	-۰/۰۰۷	-۰/۰۱۹	غلظت سرمی متابولیت های اکسید نیتریک (μmol/L)
۱۴/۵۰	۱۸/۰۲	۱۸/۱۶	۲۱/۶۲	۱۲/۶۱	۱۳/۲۱	۲۰/۶۵	۲۳/۷۲	واریانس تعیین شده (درصد)
۷۲/۵۹	۵۷/۸۰	۳۹/۷۸	۲۱/۶۲	۷۰/۱۹	۵۷/۵۸	۴۴/۳۷	۲۳/۷۲	واریانس کلی (درصد)

بارهای عاملی بیشتر یا مساوی ۰/۴ (و کمتر یا مساوی -۰/۴) با علامت (‡) مشخص شده اند که با استفاده از روش تحلیلی عاملی به دست آمده است.

جدول ۶- بار عاملی برای متغیرهای اصلی با عوامل دوران یافته در کودکان طرح قند و لیپید تهران بر اساس چاقی

افراد با وزن طبیعی (تعداد=۶۲۵)			افراد با افزایش وزن و چاق (تعداد=۲۳۶)				
عامل ۱	عامل ۲	عامل ۳	عامل ۴	عامل ۱	عامل ۲	عامل ۳	
۰/۱۹۱	۰/۸۲۶	۰/۰۸۰	۰/۰۳۵	۰/۸۰۵	۰/۰۹۰	۰/۰۲۴	فشار خون سیستولیک (mmHg)
۰/۰۸۴	۰/۸۰۵	۰/۰۲۱	-۰/۰۲۹	۰/۸۱۴	-۰/۰۷۱	۰/۰۳۶	فشار خون دیاستولیک (mmHg)
۰/۳۰۷	-۰/۰۸۰	۰/۷۲۱	-۰/۰۵۸	۰/۰۴۴	۰/۷۹۹	۰/۱۰۹	تری گلیسیرید سرمی (mg/dl)
۰/۰۵۷۵	۰/۲۳۹	-۰/۲۹۴	-۰/۱۱۱	-۰/۰۲۳	-۰/۸۳۶	۰/۰۶۸	HDL سرمی (mg/dl)
-۰/۱۰۲	۰/۱۸۳	۰/۷۹۲	۰/۰۲۱	۰/۰۶۵	۰/۰۲۸	۰/۷۰۳	قند خون ناشتا (mg/dl)
۰/۸۴۳	۰/۳۴۸	۰/۰۵۱	-۰/۰۴۶	۰/۰۶۸	۰/۴۷۳	-۰/۱۳۹	اندازه دور کمر (سانتی متر)
۰/۸۶۶	۰/۲۷۹	-۰/۰۳۶	-۰/۰۶۸	۰/۲۶۲	۰/۰۰۳	-۰/۰۵۹۰	نمایه توده بدنی ( $\text{kg/m}^2$ )
-۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	-۰/۰۲۳	۰/۹۹۲	۰/۰۹۱	-۰/۰۱۸	۰/۰۵۳۸	غلظت سرمی متابولیت‌های اکسید نیتریک ( $\mu\text{mol/L}$ )
۲۴/۲۵	۲۰/۳۲	۱۵/۵۷	۱۲/۶۲	۲۱/۴۷	۱۹/۶۹	۱۴/۶۲	واریانس تعیین شده (درصد)
۲۴/۲۵	۴۴/۵۷	۶۰/۱۴	۷۲/۷۶	۲۱/۴۷	۴۱/۱۷	۵۵/۷۸	واریانس کلی (درصد)

بازهای عاملی بیشتر یا مساوی ۰/۴ (و کمتر یا مساوی -۰/۴) با علامت (†) مشخص شده‌اند که با استفاده از روش تحلیلی عاملی به دست آمده است.

## بحث

در این مطالعه برای اولین بار الگوی عوامل خطرزای سندرم متابولیک و ارتباط آن با غلظت سرمی متابولیت‌های اکسید نیتریک در کودکان بررسی شد و نشان داد در تحلیل عاملی  $\text{NO}_x$  با دیگر اجزای سندرم متابولیک مانند فشار خون، BMI، نسبت دور کمر به دور لگن و قند خون ناشتا همراه می‌گردد. ۳ عامل در تحلیل عاملی ظاهر شدند و الگوهای عاملی در بین پسران و دختران تفاوت‌هایی نشان داد. در دختران،  $\text{NO}_x$  همراه با قند خون ناشتا، یک عامل را تشکیل داد در حالی که در پسران همراه با قند خون ناشتا و فشار خون در دو عامل وارد شد. سطح سرمی  $\text{NO}_x$  در افراد با وزن طبیعی و بدون سندرم متابولیک به صورت یک عامل مستقل عمل کرد.

شیوع سندرم متابولیک در این مطالعه (۱۰/۳ درصد با فاصله اطمینان ۹۵ درصد: ۸/۳-۱۲/۴) با دیگر گزارش‌هایی که از همین جمعیت ارائه شده است، همخوانی دارد (۱۰/۱ درصد با فاصله اطمینان ۹۵ درصد: ۹-۱۱/۱) [۲۳]. شیوع سندرم متابولیک در نوجوانان آمریکایی با دامنه سنی ۱۲ تا ۱۹ سال، ۹/۲ درصد و در کودکان و نوجوانان کانادایی با دامنه سنی ۹ تا ۱۶ سال،

۱۰/۲ تا ۱۲/۹ درصد گزارش شده است [۲۴،۵]. همراهی  $\text{NO}_x$  با دیگر اجزای سندرم متابولیک در تحلیل عاملی با مطالعات دیگر که ارتباط بین  $\text{NO}_x$  سرمی و برخی از عوامل متابولیکی را نشان داده‌اند، مطابقت دارد. گزارش شده است که در آمریکایی- آفریقایی‌های با فشار خون طبیعی، بین  $\text{NO}_x$  سرمی و فشار خون رابطه مثبت وجود دارد [۲۵]. علاوه بر آن، پیشنهاد شده که اندازه‌گیری  $\text{NO}_x$  سرمی ممکن است در بررسی وضعیت و شدت فشار خون کمک کننده باشد [۲۵]. در مطالعه حاضر،  $\text{NO}_x$  در کل جمعیت با قند خون ناشتا و نسبت دور کمر به دور لگن همراه شد در حالی که در افراد با افزایش وزن و چاقی، در کنار قند خون ناشتا و BMI قرار گرفت. این یافته‌ها با این فرضیه که اکسید نیتریک حلقه مفقوده مقاومت به انسولین در چاقی می‌باشد، همخوانی دارد [۱۷]. علاوه بر آن گزارش شده که غلظت سرمی  $\text{NO}_x$  در نوجوانان چاق در مقایسه با افراد خیلی لاغر، حدود ۱۴ برابر بالاتر است [۲۶]. بافت چربی ممکن است منبع بالقوه تولید NO باشد زیرا هر دو آنزیم نیتریک اکسید سنتاز آندوتلیالی (eNOS) و القایی (iNOS) در بافت چربی یافت شده است [۲۶].



هم‌گروهی متغیرهای متابولیک، در کودکان و نوجوانان با و بدون سندرم متابولیک و چاق و غیر چاق گزارش شده است [۲۹،۳۹].

نتایج این مطالعه، نشان داد که تعداد افراد مبتلا به سندرم متابولیک در چارک بالایی،  $NO_x$  دو برابر چارک پایینی آن بود، همچنین خطر ابتلا به سندرم متابولیک در چارک بالایی، بالاتر بود. این نتایج ارتباط بین  $NO_x$  و سندرم متابولیک را در نوجوانان نشان می‌دهد که این یافته قبلاً در بزرگسالان گزارش شده است [۱۲،۱۳]. اکسید نیتریک در انواعی از سلول‌ها تولید می‌شود. با وجود این که شناسایی مکان‌های سنتز  $NO$  صرفاً با اندازه‌گیری  $NO_x$  سرمی امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد شده که آندوتلیوم عروقی مکان اصلی تولید  $NO$  است و تعیین سطح  $NO_x$  سرمی جهت ارزیابی تولید پایه  $NO$  در سلول‌های آندوتلیوم، مفید است [۴۱]. بنابراین احتمال دارد در این مطالعه افزایش  $NO$  در سندرم متابولیک به دلیل مهار eNOS و افزایش iNOS باشد؛ همانطور که قبلاً گزارش شده است [۱۳]. اثرات پاتولوژیک و سایتوتوکسیک افزایش  $NO$  اثبات شده [۴۲،۲۸] و اخیراً نشان داده شده است که  $NO_x$  یک شاخص پیشگویی کننده میزان بقا در سالمندان محسوب می‌شود [۴۳] و موید ارتباط مثبت بین سطح بالای  $NO_x$  و اثرات زیانبار بر سلامتی می‌باشد [۱۲]. این مطالعه چندین محدودیت دارد که در بررسی یافته‌ها بهتر است به آن توجه شود. نخست این که وضع تغذیه‌ای افراد ثبت نشده است. پیشنهاد شده است که  $NO_x$  مشتق از غذا در تعیین  $NO_x$  سرمی نقش دارد [۴۴]، اما نمونه‌های خونی بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتا بودن گرفته شده‌اند و نشان داده شده که این زمان سبب حذف منبع نیترات غذایی از سرم می‌شود [۴۵] و در طی شرایط ناشتایی، تولید آنزیمی  $NO$  توسط NOS منبع غالب نیترات پلاسما است [۴۶]. دوم این که در این مطالعه، یافته‌های تحلیل عاملی بر مبنای داده‌های مقطعی می‌باشد، بنابراین نمی‌توان مستقیماً ارتباط بین  $NO_x$  و سندرم متابولیک را تعیین کرد. در نهایت، به دلیل طراحی توصیفی - مقطعی این مطالعه، نمی‌توان روابط علت و معلولی از نتایج آن استنباط کرد.

در مطالعه حاضر، سطح سرمی  $NO_x$  با گلوکز ارتباط داشت. گزارش‌ها در زمینه تاثیر دیابت بر متابولیسم  $NO$  مورد اختلاف است. هیپرگلیسمی باعث گلوکوتوکسیسمی می‌شود که به نوبه خود منجر به مقاومت به انسولین و نقص عملکرد اندوتلیوم می‌گردد [۱۴]. نشان داده شده است که تولید  $NO$  در دیابت افزایش می‌یابد [۲۷،۱۳] که ممکن است به علت افزایش بیان iNOS mRNA در جزایر لانگرهانس باشد [۲۸]. به علاوه گزارش شده است که  $NO$  سبب نقص عملکرد و تخریب سلول‌های بتا می‌شود [۲۸]. بررسی متون نشان می‌دهد که ۱۳ مطالعه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرده‌اند [۲۹،۲۴،۴-۳۹] در حالی که یک مطالعه تحلیل عاملی تاییدی را جهت سندرم متابولیک در نوجوانان به کار برده است [۴۰]، هیچ یک از این مطالعات  $NO_x$  سرمی را به عنوان یک متغیر مورد بررسی قرار نداده‌اند. تعداد عوامل بررسی شده بین ۱ تا ۵ عامل بوده و بیشتر مطالعات ۳ تا ۴ عامل را استخراج کرده‌اند، که این یافته‌ها با نتایج ما مطابقت دارد. در این مطالعه بار عاملی معکوسی برای  $NO_x$  در عامل دوم و سوم در پسران مشاهده شد، که این الگو با گزارش‌های قبلی برای گلوکز همخوانی داشت، با وجود این، اتیولوژی آن هنوز مبهم است [۴،۲۴]. علاوه بر آن در مردان  $NO_x$  در عوامل دوم و سوم با یک بار عاملی بیشتر از ۰/۴ و در اولین عامل، با بار عاملی نزدیک به ۰/۳ وارد شد که می‌تواند بیانگر نقش مرتبط کننده این متغیر باشد. پسران در مقایسه با دختران مقادیر  $NO_x$  بالاتری داشتند. پیشنهاد شده است که انسولین نقش برقرار کننده ارتباط بین سایر اجزای سندرم متابولیک داشته باشد که در این مطالعه اندازه‌گیری نشده است، لذا یافته‌های این مطالعه در این خصوص باید با دقت بیشتری مد نظر قرار گیرد [۳۱]. با وجود این،  $NO_x$  در حضور چاقی که به نظر می‌رسد به عنوان یک متغیر مرتبط عمل می‌کند، نقش ندارد [۲۴].

در مطالعه حاضر، در افراد بدون سندرم متابولیک و آنهایی که وزن طبیعی داشتند،  $NO_x$  به عنوان یک عامل مجزا عمل کرد در حالی که در افراد با سندرم متابولیک و مبتلا به افزایش وزن و چاق،  $NO_x$  با قند خون ناشتا یا BMI همراه شد. همسو با نتایج این مطالعه، الگوهای متفاوتی از

### سپاسگزاری

این مطالعه با حمایت مالی پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (طرح شماره ۱۷۷) انجام شد. از زحمات سرکار خانم‌ها خراسانی و سربخش تقدیر و تشکر می‌شود.

به طور خلاصه نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که  $NO_x$  سرمی با سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان ارتباط دارد. علاوه بر این، در آنالیز بررسی هم‌گروهی عوامل خطرزای متابولیکی،  $NO_x$  با دیگر اجزای سندرم متابولیک به ویژه قند خون ناشتا همراه می‌شود و ممکن است یک نقش مرتبط کننده در هم‌گروهی اجزای سندرم متابولیک در مردان داشته باشد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

### ماخذ

1. Meigs JB. Invited commentary: insulin resistance syndrome? Syndrome X? Multiple metabolic syndrome? A syndrome at all? Factor analysis reveals patterns in the fabric of correlated metabolic risk factors. *Am J Epidemiol* 2000; 152: 908-911; discussion 12.
2. Pladevall M, Singal B, Williams LK, Brotons C, Guyer H, Sadurni J et al. A single factor underlies the metabolic syndrome: a confirmatory factor analysis. *Diabetes Care* 2006; 29: 113-122.
3. Kohen-Avramoglu R, Theriault A, Adeli K. Emergence of the metabolic syndrome in childhood: an epidemiological overview and mechanistic link to dyslipidemia. *Clin Biochem* 2003; 36: 413-420.
4. Goodman E, Dolan LM, Morrison JA, Daniels SR. Factor analysis of clustered cardiovascular risks in adolescence: obesity is the predominant correlate of risk among youth. *Circulation* 2005; 111: 1970-1977.
5. De Ferranti SD, Osganian SK. Epidemiology of paediatric metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus. *Diab Vasc Dis Res* 2007; 4: 285-296.
6. Expert. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA* 2001; 285: 2486-2497.
7. Reimann M, Schutte AE, Malan L, Huisman HW, Malan NT. Hyperuricaemia is an independent factor for the metabolic syndrome in a sub-Saharan African population: a factor analysis. *Atherosclerosis* 2008; 197: 638-645.
8. Hanley AJ, Festa A, D'Agostino RB, Jr., Wagenknecht LE, Savage PJ, Tracy RP et al. Metabolic and inflammation variable clusters and prediction of type 2 diabetes: factor analysis using directly measured insulin sensitivity. *Diabetes* 2004; 53: 1773-1781.
9. Sakkinen PA, Wahl P, Cushman M, Lewis MR, Tracy RP. Clustering of procoagulation, inflammation, and fibrinolysis variables with metabolic factors in insulin resistance syndrome. *Am J Epidemiol* 2000; 152: 897-907.
10. Yoon S, Moon J, Shin C, Kim E, Jo SA, Jo I. Smoking status-dependent association of the 27-bp repeat polymorphism in intron 4 of endothelial nitric oxide synthase gene with plasma nitric oxide concentrations. *Clinica Chimica Acta* 2002; 324: 113-120.
11. Dudzinski DM, Igarashi J, Greif D, Michel T. The regulation and pharmacology of endothelial nitric oxide synthase. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 2006; 46: 235-276.
12. Ueyama J, Kondo T, Imai R, Kimata A, Yamamoto K, Suzuli K et al. Association of serum  $NO_x$  level with clustering of metabolic syndrome components in middle-aged and elderly general populations in Japan *Environ Health Prev Med* 2008; 13: 36-42.
13. Zahedi Asl S, Ghasemi A, Azizi F. Serum nitric oxide metabolites in subjects with metabolic syndrome. *Clin Biochem* 2008; 41: 1342-1347.
14. Kim JA, Montagnani M, Koh KK, Quon MJ. Reciprocal relationships between insulin resistance and endothelial dysfunction: molecular and pathophysiological mechanisms. *Circulation* 2006; 113: 1888-1904.
15. Perreault M, Marette A. Targeted disruption of inducible nitric oxide synthase protects against obesity-linked insulin resistance in muscle. *Nat Med* 2001; 7: 1138-1143.
16. Colasanti M, Suzuki H. The dual personality of NO. *Trends Pharmacol Sci* 2000; 21: 249-252.
17. Dallaire P, Marette A. Obesity-linked insulin resistance: is nitric oxide the missing link? *Can J Diabetes* 2004; 28: 59-66.
18. Azizi F, Rahmani M, Emami H, Madjid M. Tehran Lipid and Glucose Study: Rationale and Design. *CVD Prevention* 2000; 3: 242-247.
19. Ghasemi A, Zahedi Asl S, Mehrabi Y, Saadat N, Azizi F. Serum nitric oxide metabolite levels in a general healthy population: relation to sex and age. *Life Sci* 2008; 83: 326-331.
20. National. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics* 2004; 114: 555-576.

21. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *BMJ* 2000; 320: 1240-1243.
22. Dixon JK. Exploratory factor analysis. In: Munro BH, ed. *Statistical methods for health care research*. Fifth ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2005:P. 321-350.
23. Esmailzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Etemadi A, Azizi F. High prevalence of the metabolic syndrome in Iranian adolescents. *Obesity (Silver Spring)* 2006; 14: 377-382.
24. Lambert M, Paradis G, O'Loughlin J, Delvin EE, Hanley JA, Levy E. Insulin resistance syndrome in a representative sample of children and adolescents from Quebec, Canada. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2004; 28: 833-841.
25. Higashino H, Miya H, Mukai H, Miya Y. Serum nitric oxide metabolite (NOx) levels in hypertensive patients at rest: a comparison of age, gender, blood pressure and complications using normotensive controls. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 2007; 34: 725-731.
26. Choi JW, Pai SH, Kim SK, Ito M, Park CS, Cha YN. Increase in nitric oxide concentrations correlate strongly with body fat in obese humans. *Technical Briefs* 2001; 47: 1106-1109.
27. Ding Y, Vaziri ND, Coulson R, Kamanna VS, Roh DD. Effects of simulated hyperglycemia, insulin, and glucagon on endothelial nitric oxide synthase expression. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2000; 279: E11-17.
28. Shimabukuro M, Ohneda M, Lee Y, Unger RH. Role of nitric oxide in obesity-induced beta cell disease. *J Clin Invest* 1997; 100: 290-295.
29. Kelishadi R, Ardalan G, Adeli K, Motaghian M, Majdzadeh R, Mahmood-Arabi MS et al. Factor analysis of cardiovascular risk clustering in pediatric metabolic syndrome: CASPIAN study. *Ann Nutr Metab* 2007; 51: 208-215.
30. Ghosh A. Factor analysis of risk variables associated with metabolic syndrome in Asian Indian adolescents. *Am J Hum Biol* 2007; 19: 34-40.
31. Chen W, Srinivasan SR, Elkasabany A, Berenson GS. Cardiovascular risk factors clustering features of insulin resistance syndrome (Syndrome X) in a biracial (Black-White) population of children, adolescents, and young adults: the Bogalusa Heart Study. *Am J Epidemiol* 1999; 150: 667-674.
32. Park HS, Lee MS, Park JY. Leptin and the metabolic syndrome in Korean adolescents: factor analysis. *Pediatr Int* 2004; 46: 697-703.
33. Retnakaran R, Zinman B, Connelly PW, Harris SB, Hanley AJ. Nontraditional cardiovascular risk factors in pediatric metabolic syndrome. *J Pediatr* 2006; 148: 176-182.
34. Dwyer T, Blizzard L, Venn A, Stankovich JM, Ponsonby AL, Morley R. Syndrome X in 8-year-old Australian children: stronger associations with current body fatness than with infant size or growth. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2002; 26: 1301-1309.
35. Ravaja N, Keltikangas-Jarvinen L, Viikari J. Life changes, locus of control and metabolic syndrome precursors in adolescents and young adults: a three-year follow-up. *Soc Sci Med* 1996; 43: 51-61.
36. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, Tamborlane WV, Taksali SE, Yeckel CW et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. *N Engl J Med* 2004; 350: 2362-2374.
37. Batey LS, Goff DC, Jr., Tortolero SR, Nichaman MZ, Chan W, Chan FA et al. Summary measures of the insulin resistance syndrome are adverse among Mexican-American versus non-Hispanic white children: the Corpus Christi Child Heart Study. *Circulation* 1997; 96: 4319-4325.
38. Schutte AE, van Rooyen JM, Huisman HW, Kruger HS, de Ridder JH. Factor analysis of possible risks for hypertension in a black South African population. *J Hum Hypertens* 2003; 17: 339-348.
39. Moreno LA, Pineda I, Rodriguez G, Fleta J, Giner A, Juste MG et al. Leptin and metabolic syndrome in obese and non-obese children. *Horm Metab Res* 2002; 34: 394-399.
40. Li C, Ford ES. Is there a single underlying factor for the metabolic syndrome in adolescents? A confirmatory factor analysis. *Diabetes Care* 2007; 30: 1556-1561.
41. Tanaka S, Yashiro A, Nakashima Y, Nanri H, Ikeda M, Kuroiwa A. Plasma nitrite/nitrate level is inversely correlated with plasma low-density lipoprotein cholesterol level. *Clin Cardiol* 1997; 20: 361-365.
42. Curcelli EC, Muller SS, Novelli Filho JL. Beneficial effects of diclofenac therapy on serum lipids, oxidized low-density lipoprotein and antioxidant defenses in rats. *Life Sci* 2008; 82: 892-898.
43. Osawa M, Hayashi T, Nomura H, Funami J, Miyazaki A, Ignarro LJ et al. Nitric oxide (NO) is a new clinical biomarker of survival in the elderly patients and its efficacy might be nearly equal to albumin. *Nitric Oxide* 2007; 16: 157-163.
44. Himeno M, Ishibashi T, Nakano S, Furuya K, Kigoshi T, Uchida K et al. A practical procedure for achieving a steady state of NOx concentration in plasma: with special reference to the NOx content of Japanese daily food. *Tohoku J Exp Med* 2003; 199: 95-110.
45. Node K, Kitakaze M, Yoshikawa H, Kosaka H, Hori M. Reduced plasma concentrations of nitrogen oxide in individuals with essential hypertension. *Hypertension* 1997; 30: 405-408.
46. Bryan NS, Grisham MB. Methods to detect nitric oxide and its metabolites in biological samples. *Free Radic Biol Med* 2007; 43: 645-657.