

تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن‌های مبادله‌گر سدیم هیدروژن ۱ (NHE1) و هم انتقال دهنده سدیم بی‌کربنات ۱ (NBC1) در عضله قلب رت‌های دیابتی نوع ۲

امیرعباس منظمی^{*}، حمید رجبی^۲، رضا قراخانلو^۳، علی مصطفایی^۱، کبری امیدفر^۴، وحید شهبازی ندر^۵، حمیدرضا محمدی مطلق^۶

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه پیش رو تعیین اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن‌های مبادله‌گر سدیم هیدروژن ۱ (NHE1) و هم انتقال دهنده سدیم بی‌کربنات ۱ (NBC1) در عضله قلب رت‌های دیابتی نوع ۲ بود.

روش‌ها: تعداد ۴۰ رت نژاد ویستار نر در سن ۴ هفتگی با میانگین وزن $۹۳/۷ \pm ۹/۸$ گرم انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه کنترل سالم (۷ سر رت) کنترل دیابتی (۹ سر رت) و تمرینی دیابتی (۹ سر رت) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسمین و مصرف غذای پرچرب ایجاد و تمرین استقامتی (دویلن روی نوار گردان جوندگان، شروع با ۲۰ متر بر دقیقه تدریجی^۷ به ۳۰ متر بر دقیقه در هفته آخر) به مدت ۷ هفته، بر گروه تمرینی دیابتی اعمال شد. جهت تایید مقاومت انسولین از مقادیر HOMA-IR استفاده گردید. ۴۸ ساعت پس از اتمام پروتکل تمرینی، رت‌ها تشریح و عضلات قلب آنها استخراج شد. اندازه‌گیری انسولین پلاسمما به روش الایزا، غلظت گلوکز پلاسمما با روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و میزان بیان ژن NHE1 mRNA و NBC1 mRNA (Real time-PCR) از طریق روش REST (permutation test) میزان بیان ژن NHE1 mRNA و NBC1 mRNA با استفاده از روش $\Delta\Delta^{CT}$ محاسبه گردید. جهت تعیین معنی‌دار بودن تفاوت متغیرها بین گروه‌های تحقیق از آزمون آماری t مستقل و با استفاده از نرم‌افزار REST (permutation test) (permutation test) گردید. مقدار α در تمامی مراحل برابر با ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد مقادیر HOMA-IR INDEX در دو گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم بیشتر بود ($P < 0/001$)، همچنین اختلاف معنی‌دار بین میزان بیان NHE1 mRNA (NHE1 mRNA) بین گروه کنترل دیابتی و کنترل سالم دیده شد ($P < 0/05$). میزان بیان NBC1 mRNA و NHE1 mRNA (NHE1 mRNA) گروه تمرینی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش داشت اما این افزایش معنی‌دار نبود ($P < 0/05$). همچنین اختلاف معنی‌دار در بیان NBC1 mRNA (NBC1 mRNA) بین گروه کنترل دیابتی و کنترل سالم یافت نشد ($P < 0/05$).

نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که بیان ژن NHE1 mRNA و NBC1 mRNA در گروه کنترل دیابتی کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد و تمرین استقامتی می‌تواند این کاهش بیان را در گروه تمرینی دیابتی جبران و به سطوح نرمال نزدیک کند.

واژگان کلیدی: تنظیم pH درون سلولی، تمرین استقامتی، مبادله‌گر سدیم هیدروژن، هم انتقال دهنده سدیم بی‌کربنات

۱- دانشگاه رازی کرمانشاه

۲- دانشگاه تربیت معلم تهران

۳- دانشگاه تربیت مدرس تهران

۴- مرکز تحقیقات غدد/پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- دانشگاه پیام نور

۶- مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

*نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تلفن: ۰۹۱۲۷۲۶۱۰۲۶، نمبر: ۰۸۳۱-۴۲۷۴۵۸۵ پست الکترونیک: monazzami.amirabbas@gmail.com

پروتون در شرایط دیابت نوع ۲ و فعالیت ورزشی به تاخیر
بی‌اندازد [۹،۱۰].

به هر حال در شرایط دیابت نوع ۲ و فعالیت ورزشی سازوکارهایی جهت هوموستاز pH_i فعال می‌شوند که از مهمترین آنها می‌توان به فعالیت سیستم تامپونی و فعالیت انتقال دهندهای غشایی اشاره کرد. تغییر سریع در غلظت سیتوپلاسمی یون هیدروژن به وسیله سازوکارهای تامپونی که از بی‌کربنات، فسفات و پروتئین استفاده می‌کنند حتی می‌شود اما به دلیل ظرفیت محدود این سازوکارها سلول به وسیله سازوکارهای انتقالی ویژه pH_i را حفظ می‌کنند [۱۱]. مهمترین انتقال دهندهای غشایی در تنظیم pH_i در حالت استراحت و فعالیت عضلانی مبادله‌گر سدیم- هیدروژن، هم انتقال دهنده سدیم- بی‌کربنات و هم انتقال دهنده لاكتات - پروتون می‌باشند. در این مجموعه MCT^۳ها یا انتقال دهندهای لاكتات و پروتون به عنوان تنظیم کننده‌های وابسته به لاكتات و NBC^۳ها (انتقال دهنده سدیم و بی‌کربنات که دارای ۴ ایزوفرم وابسته به بافت هستند) و NHE^۴ها (مبادله‌گر سدیم و هیدروژن که دارای ۱۰ ایزوفرم وابسته به بافت هستند) هر دو به عنوان تنظیم کننده‌های غیر وابسته به لاكتات شناسایی شده‌اند [۹،۱۰]. در حالت استراحت و فعالیت با شدت پایین بخش عمده‌ای از خشی سازی پروتون با مبادله‌گر سدیم- هیدروژن و هم انتقال دهنده سدیم- بی‌کربنات تعديل می‌شود اما در شرایط فعالیت با شدت بالا هم انتقال دهندهای لاكتات- پروتون که با شبیه لاكتات بالا تحریک می‌شوند بخش عمده تعديل pH_i را به عهده می‌گیرند [۹،۱۰]. با توجه به ویژگی‌های ساختاری و عملکردی عضله قلب، نشان داده شده است که مبادله‌گر و انتقال دهنده NHE1 و NBC1 نقش بسیار مهمی را در تنظیم pH_i در شرایط اسیدوز ناشی از دیابت نوع ۲ و تمرين ایفا می‌کنند و فعالیت و عملکرد آنها از دلایل توجیهی جهت پاسخ‌های تطبیقی قلب به این شرایط است [۹،۱۰].

مطالعه تغییرات NHE1 و NBC1 در عضله قلب فقط به تعدادی تحقیق در زمینه فعالیت و بیان پروتئین محدود

مقدمه

کترول و تنظیم pH_i سلول قلب جهت حفظ انقباض‌های مکرر عضلانی و جلوگیری از آسیب در حین فعالیت‌های ورزشی و همچنین در شرایط پاتو فیزیولوژیکی دیابت نوع ۲ از اهمیت خاصی برخوردار است [۱-۳]. بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که تجمع یون هیدروژن و در پی آن اسیدوز طی فعالیت‌های ورزشی در کاهش عملکرد ورزشی از طریق تغییر در ساختار پروتئین‌ها و کانال‌های یونی و اختلال در عملکرد آنها و همچنین اختلال در فعالیت آنزیم‌های کلیدی مسیر گلیکولیز و نهایتاً اختلال در سرعت سنتز ATP انجام می‌گیرد [۴]. در عضله قلب تجمع یون هیدروژن و در پی آن اسیدوز با تاثیر بلقوه بر هر مرحله از فرایند زوج تحریک - انقباض و هوموستاز کلسیم موجب اختلال در انقباض میوسیت می‌گردد [۵]. هر چند سازوکارهایی که از طریق آن اسیدوز موجب اختلال در عملکرد انقباضی میوسیت می‌گردد به خوبی مشخص نشده، اما نشان داده شده است که اسیدوز علاوه بر اثر بر روی فرایند زوج تحریک - انقباض، همچنین از طریق مهار کانال‌های کلسیمی، کاهش ذخیره کلسیم شبکه سارکوپلاسمی و تغییر جایگاه کلسیم در سیتوپلاسم موجب اختلال در عملکرد کلسیم می‌گردد [۶].

کاهش pH_i میوسیت در شرایط دیگری مانند دیابت نوع ۲ که در آن به علت مقاومت سلول‌ها به انسولین و افزایش مصرف ترکیبات کتونی ایجاد می‌شود، نیز اتفاق می‌افتد [۷]. در این شرایط، پروتئین‌ها ماهیت خود را از دست می‌دهند و منجر به آسیب به بافت، اختلال در عملکرد و نقص ارگان می‌شوند [۷]. علاوه بر بیماری‌های شریان کرونری و افزایش فشار خون، هایپرتروفی بطن چپ از جمله مهمترین مشکلاتی است که در عضله قلب دیابتی نوع ۲ به وجود می‌آید که با تنظیم pH_i در ارتباط است [۸]. در این شرایط دیابت از طریق اسیدوز موجب اختلال در عملکرد انتقال دهندهای غشایی که مسئول تنظیم pH_i هستند، می‌گردد. در نتیجه برای سلول قلبی حیاتی است که کاهش pH_i را در سیتوپلاسم از طریق جلوگیری از تجمع

2. Monocarboxilate Cotransporter

3. Na+/HCO₃ Cotransporter

4. Na+/H⁺ Cotransporter

1. Intracellular pH

توسط Baker و همکاران بر روی رت‌ها انجام گرفت نشان داده شد که تمرینات با شدت پایین موجب افزایش بیان mRNA (MCT1) در قلب و تمرینات با شدت بالا فقط در عضلات اسکلتی اکسیداتیو موجب افزایش mRNA (MCT1) می‌شوند [۱۹]. در تحقیق دیگر Juel و همکاران اثر تمرینات قدرتی بر محتوی پروتئینی MCT1 و MCT4 عضلات اسکلتی افراد دیابتی نوع ۲ را مورد ارزیابی قرار دادند و نشان دادند که محتوی MCT1 در گروه کترول دیابتی نسبت به گروه کترول سالم پایین‌تر است و تمرین قدرتی محتوی پروتئینی MCT1 را در گروه تمرینی دیابتی افزایش داده است و آن را به شرایط نرمال رسانده است [۲۰]. همچنین Claire و همکاران اثر تمرینات ایترووال شدید بر محتوی پروتئینی MCT1 و MCT4 و NBC را مورد ارزیابی قرار دادند و افزایش محتوی پروتئینی MCT1 و NBC در تارهای کند نسبت به تند را نشان دادند [۲۱]. در تحقیق دیگر Rasmussen و همکاران نشان دادند که یک جلسه تمرین سرعتی موجب افزایش معنی‌دار در بیان mRNA (NHE1) عضلات اسکلتی رت می‌شود. آنها همچنین گزارش کردند که سه هفته تمرین استقامتی موجب افزایش معنی‌دار بیان mRNA (NHE1) در عضلات اسکلتی کند می‌گردد اما این افزایش در سطح پروتئین NHE1 در عضلات اسکلتی معنی‌دار نبود [۲۲]. Juel و همکاران در یک تحقیق اثر تمرین با شدت زیاد بر محتوی NHE1 عضلات کند و تند رت‌ها را مورد بررسی قرار دادند و نشان داده شد که ایزوفرم NHE1 در عضلات بیان می‌شود و همچنین تمرین با شدت زیاد موجب افزایش محتوی این انتقال دهنده به میزان ۳۶ و ۲۹ درصد به ترتیب در تارهای گلیکولیتیکی و اکسیداتیوی می‌شود [۲۳]. در مجموع به نظر می‌رسد این گونه تحقیقات بیشتر انتقال دهنده‌هایی را که در شرایط تمرینات بیشینه فعال می‌شوند مورد توجه قرار داده‌اند و همچنین تحقیقات محدودی در زمینه اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن این انتقال دهنده‌ها در عضله قلب دیابتی وجود دارد.

در نتیجه با توجه به تحقیقات محدود در زمینه اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن این انتقال دهنده‌ها در عضله قلبی در شرایط سالم و دیابت نوع ۲، در این تحقیق به بررسی این

می‌شود و در زمینه بیان ژن این انتقال دهنده‌ها در شرایط دیابت نوع ۲ و تمرین تحقیقات محدودی صورت گرفته است. در یک مطالعه Prigent و همکاران نشان دادند که فعالیت مبادله‌گر NHE1 در عضله قلب رت‌های دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین^۱ کاهش می‌یابد [۱۲]. هر چند کاهش فعالیت NHE1 ممکن است به علت کاهش بیان ژن آن در شرایط دیابت نوع ۲ باشد اما Pierce و همکاران نشان دادند بیان ژن mRNA (NHE1) عضله قلب گروه دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین پس از ۸ هفته تفاوت معنی‌داری با گروه کترول ندارد [۱۳]. Prigent و همکاران در تحقیق دیگر نتایج مشابهی در ارتباط با اثر دیابت بر فعالیت NBC1 در گروه دیابتی نسبت به کترول گزارش کردند [۱۴]. همچنین در تحقیقی که توسط Gan و همکاران بر روی عضله قلب رت‌ها انجام گرفت، نشان داده شد که ایسکمی عضله قلب موجب افزایش بیان ژن Sandman (NHE1) می‌گردد [۱۵]. علاوه بر این و همکاران در تحقیق دیگر گزارش کردند که در اثر انسداد عروق کرونری قلب بیان ژن و پروتئین هر دو مبادله‌گر و انتقال دهنده NBC1 و NHE1 افزایش پیدا می‌کند [۱۶]. Jandeleit-dahm و همکاران در تحقیقی دیگر نشان دادند که بیان ژن mRNA (NHE1) نیز در عضلات عروق رت‌های دیابتی افزایش می‌یابد [۱۷].

در تحقیق دیگر که توسط Darmellah و همکاران انجام گرفت، نشان داده شد که افزایش فعالیت NHE1 در رت‌های دیابتی با هایپرتروفی قلب مرتبط بوده و این افزایش فعالیت بدون تغییر در محتوی پروتئینی این انتقال دهنده رخ داده است. آنها همچنین گزارش کردند که بین NHE1 و عوامل درگیر در هایپرتروفی قلب ارتباط وجود دارد [۸].

نیکوبی و همکاران، در یک مطالعه اثر تمرینات استقامتی بر بیان ژن و محتوی پروتئینی MCT1 و MCT4 در عضلات اسکلتی رت‌های دیابتی و سالم را مورد ارزیابی قرار دادند، نتایج نشان داد که تمرین استقامتی بیان ژن و محتوی پروتئینی MCT1 و MCT4 را در گروه تمرینی دیابتی و سالم افزایش داده است [۱۸]. همچنین در تحقیق دیگر که

1. Streptozotocin

عنوان ديابت تعريف و رت هاي واجد شرایط وارد تحقيقات شدند [۲۴].

پروتکل تمرينی

تمرين استقامتي به مدت ۷ هفته، هر روز بر گروه تمرينی ديابتی اعمال شد (جدول ۲). به دليل شرایط خاص رت هاي تحقيقات (ديابت شديد)، اعمال مدت هاي طولاني تر تمرينی بيشتر از ۳۵ دقيقه امكان پذير نبود و اين مدت به عنوان مدت نهايی در اواخر تمرين در نظر گرفته شد. ضمن اين که شدت به گونه ای انتخاب گردید که سطوح لاكتات را در حين تمرين دستخوش تغيير قابل ملاحظه نماید (۶۰-۷۰ درصد VO_{2MAX}). Brooks و همکاران نشان دادند که اين شدت تمرينی موجب افزایش قابل توجه سطوح لاكتات می شود [۲۵]. تمامی اين اطلاعات با انجام مطالعات پايلوت روی ۴ رت به دست آمد. ميزان لاكتات در شدت تمرينی ۳۰ متر بر دقيقه (۶۰ تا ۷۰ درصد vo_{2max}) برابر با ۴ ميلی مولار بود. دو هفته آخر نيز تمامی متغيرهای تمرينی ثابت نگه داشته شدند تا سازگاري هاي انجام شده در زمان تشریح به حالت يکنواخت خود برسند [۲۶، ۲۷].

تست HOMA-IR¹

۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرينی، بعد از ۸ ساعت ناشتايی نمونه خونی به ميزان ۱ ميلی لیتر از چشم حيوان جمع آوري و جداسازی پلاسمما با سانتريفيوژ کردن در ۳۰۰۰g-۱۰min انجام و جهت اندازه گيري گلوکز و انسولین ناشتايی جهت تعين HOMA-IR در EZRMI-13K-۸۰ ميلی لیتر، # catalog number: HOMA-IR با استفاده از فرمول زير محاسبه گردید [۲۷]:

$$\text{HOMA-IR} = \text{Insulin} [\mu\text{U}/\text{ml}] * \text{Glucose} [\text{mmol}/\text{l}] / 22.5$$

كه؛ ۱)- آيا تمرين استقامتي بيان ژن اين انتقال دهندهها را تغيير می دهد و ۲)- تعامل پاسخ تمرين و ديابت بر بيان ژن اين انتقال دهندهها چگونه است؟، پرداخته می شود تا از اين طريق برخى از سازوکارهای مسئول تنظيم pH_i در عضله قلب معين گردد.

روش ها

تعداد ۴۰ رت نر نژاد ويستار در سن ۴ هفتگی با ميانگين وزني $93/7 \pm 9/8$ گرم از انتستيو پاستور ايران تهيي و در شرایط دمایي 22 ± 4 درجه سانتي گراد تحت سikel ۱۲ ساعت تاريکي - روشناني نگهداري شدند. وزن حيوان به طور روزانه ثبت و رت ها با غذاي مخصوص رت و آب تغذيه شدند. بعد از گذشت دو هفته (سازگاري با محيط آزمایشگاه و رسيدن به وزن مطلوب)، رت ها با ميانگين وزن $183/47 \pm 11/4$ گرم به طور تصادفي ضمن همسان سازی بر اساس وزن به سه گروه كترل سالم (سر رت)، كترل ديابتی (سر رت) و تمرينی ديابتی (سر رت) تقسيم شدند. ديابت در اين تحقيق از طريق ترکيب مصرف غذاي پر چرب و تزريق استرپتووزوتوكسين ايجاد شد. غذاي مورد استفاده شامل ۵۸ درصد چربی، ۲۵ درصد پروتئين و ۱۷ درصد كربوهيدرات بود و عناصر تشکيل دهنده آن در جدول ۱ گزارش شده است [۲۴]. اين ترکيب غذايی به وسیله تيم تحقيق به صورت دست ساز و با همکاري شركت کانلي دام و مؤسسه واکسن سازی و سرم سازی رازی ايران انجام گرفت. رت هاي گروه ديابتی به مدت دو هفته تحت مصرف غذاي چرب قرار گرفتند در حالی که گروه كترل سالم غذاي طبيعی مصرف می کرد. بعد از آن تزريق درون صفاقی استرپتووزوتوكسين به ميزان ۳۵ ميلی گرم به ازاي هر كيلو گرم در بافر سيترات PH=۴/۵M بعد از ۶ ساعت ناشتايی در دو گروه ديابتی انجام گرفت. ۴۸ ساعت بعد از تزريق دارو، نمونه خونی از چشم حيوان جمع آوري و جداسازی سرم با سانتريفيوژ ۳۰۰۰g-۱۰min انجام و غلظت گلوکز از روش آنزيمی گلوکز اکسیداز با کيت شركت پارس آزمون اندازه گيري گردید. غلظت گلوکز بالاتر از ۳۰۰ dl/mg به

1. Homeostasis model of insulin resistance

PCR با استفاده غلظت $100\text{ }\mu\text{g}$ از cDNA انجام گرفت (جدول ۴). برنامه مورد استفاده در Real time شامل 94^0 به مدت ۵ دقیقه - 94^0 به مدت ۴۵ (باز شدن ۴۵ ثانیه)، 60^0 به مدت ۴۵ ثانیه (جفت شدن) و 72^0 به مدت ۴۵ ثانیه (تکثیر) (تکرار ۴۰ سیکل) بود. میزان بیان ژن‌های موردنظر با روش $\Delta\Delta\text{ct}$ اندازه‌گیری شد [۱۶، ۲۲].

تجزیه و تحلیل آماری

بعد از این که نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون K-S تأیید شد، جهت تعیین معنی‌دار بودن تفاوت متغیرها بین گروه‌های تحقیق از آزمون آماری t مستقل و با استفاده از نرمافزار (تکرار REST) (permutation test) استفاده گردید. مقدار α در تمامی مراحل برابر با 0.05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

وزن بدن

تغییرات وزن بدن در شکل ۱ گزارش شده است. کاهش اندک در وزن بدن در هفته بعد از تزریق استرپتوزوتوسین در گروه‌های دیابتی مشاهده و بعد از آن روند افزایش وزن در تمامی گروه‌ها به صورت طبیعی ادامه یافت. بعد از گذشت ۴ هفته از زمان شروع مصرف غذای پرچرب توسط گروه‌های دیابتی، اختلاف وزن بین گروه کنترل دیابتی و سایر گروه‌ها معنی‌دار شد و این اختلاف تا پایان تحقیق ادامه داشت.

تأثیر STZ و غذای پرچرب بر متغیرهای متابولیک
جدول ۵ تأثیر استرپتوزوتوسین و غذای پرچرب بر متغیرهای متابولیک را نشان می‌دهد. همچنین نتایج گلوکز خون پلاسما قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی در شکل ۲ آورده شده است. نتایج تست تأیید دیابت قبل از شروع تحقیق افزایش معنی‌دار سطح گلوکز خون (Pre glucose) در گروه‌های دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم را نشان داد ($P < 0.01$). نتایج آزمون HOMA-IR نیز در پایان تحقیق اختلاف معنی‌دار بین سطوح گلوکز خون پلاسما بین

واجد بودن شرایط مقاومت انسولین منوط به داشتن دو شرط بود: ۱- مقادیر HOMA-IR بالاتر از $2/5$ [۲۷] و ۲- مقادیر انسولین ناشتابی بالاتر از 160 پیکومول [۲۷] و تنها رت‌هایی که شرایط فوق را دارا بودند در تجزیه و تحلیل نهایی وارد شدند.

استخراج نمونه

۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی رت‌ها به وسیله تزریق درون صفاقی کتمامی ($90\text{ }\mu\text{l}$ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم) و زایلazin ($10\text{ }\mu\text{l}$ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم) بی‌هوش و عضلات نعلی و باز کننده طویل انگشتان پا (EDL) بلا فاصله استخراج و در نیتروژن -80°C منجمد و برای تجزیه و تحلیل بعدی نگهداری شد [۱۹].

Real time-PCR

حدود $50\text{ }\mu\text{l}$ گرم عضله با روش هاون کوبی پودر گردید و جهت استخراج RNA تام به نسبت $1:10$ در بافر لیز Bisol RNA-Lysis reagent به مدت 15 دقیقه هموژن گردید. به منظور برداشتن اجزای پروتئینی محصول حاصل در 4°C 10 دقیقه، 12000 g سانتریفیوژ شد. سوپرناتانت برداشته و با نسبت $1:10/2$ Isol اولیه با کلروفورم مخلوط و به مدت هر 15 ثانیه یک بار به آرامی تکان داده شد و سپس محصول را به مدت 15 دقیقه روی یخ قرار گرفت. محصول در 4°C 15 دقیقه، 12000 g سانتریفیوژ و بخش RNA معده‌نی و آلی از هم جدا شدند، بخش محتوی RNA برداشته و هم حجم مایع رویی به آن ایزوپروپانول اضافه نموده و به مدت بیش از 20 دقیقه در یخچال -20°C قرار داده تا RNA جداسازی شود. در مرحله بعد محصول را به مدت 10 دقیقه، 4°C 12000 g سانتریفیوژ نموده تا RNA رسوب کند. رسوب حاوی RNA در اتانول 75 درصد شستشو و در $20\text{ }\mu\text{l}$ آب فاقد RNAS-Free حل گردید. غلاظت RNA با استفاده از دستگاه نانودرایپ سنجیده و نسبت $2:20$ به $1/8$ بین $2\text{ }\mu\text{l}$ تا $2\text{ }\mu\text{l}$ به عنوان تخلیص مطلوب تعریف گردید. cDNA با استفاده از یک میکروگرم از RNA و با استفاده از Reverse primers و آنزیم Real-Time نسخه‌برداری معکوس انجام گرفت (جدول ۳).

در میزان بیان mRNA (NHE1) در گروه تمرينی دیابتی ۱۸ (درصد) نسبت به گروه کنترل دیابتی این افزایش معنی‌دار نبود ($P > 0.05$). از طرف دیگر افزایش بیان NBC1 در گروه تمرينی دیابتی (۶ درصد) نسبت به گروه کنترل دیابتی، موجب تغییر معنی‌دار در بین گروه‌ها نشد (شکل ۵) ($P < 0.05$).

جدول ۱- ترکیب غذای پرچرب و عناصر تشکیل دهنده آن

عنصر تشکیل دهنده	گرم / کیلو گرم
پودر غذای طبیعی رت	۳۶۵
روغن گیاهی	۳۱۰
کازئین	۲۵۰
کلسترول	۱۰
ویتامین و مواد معدنی	۶۰
متیونین	۳
کلرايد سدیم	۱
جوش شیرین	۱

گروه‌های دیابتی و گروه کنترل سالم را نشان داد (شکل ۳). ($P < 0.001$).

همان طور که در جدول ۵ نشان داده شده است اختلاف معنی‌دار بین سطوح انسولین پلاسمای گروه کنترل دیابتی و دو گروه دیگر ($P < 0.05$) به دست آمد (شکل ۲) ($P < 0.05$). همچنین مقادیر HOMA-IR index در دو گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم افزایش معنی‌دار داشت ($P < 0.001$)، ضمن این که بین دو گروه دیابتی نیز اختلاف معنی‌دار مشاهده شد ($P < 0.01$).

NBC1 و NHE1

کل تغییرات بیان ژن NHE1 و NBC1 در گروه‌های دیابتی مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل از RQ (Relative quantification) طریق محاسبه ارزش mRNA استاندارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بیان ژن NHE1 در گروه کنترل دیابتی ۲۵ درصد کاهش داشت ($P < 0.05$). همچنین کاهش بیان NBC1 در گروه کنترل دیابتی ۱۹ درصد بود (شکل ۴) ($P < 0.05$). علی‌رغم افزایش

جدول ۲- مشخصات پروتکل تمرينی

زمان	آشنازی ۵ روز	آشنازی ۵ هفته	آشنازی ۶ هفته	آشنازی ۷ هفته
سرعت (m/min)	۱۵	۲۰	۳۰	۳۰
مدت (min)	۲۰	۲۰	۳۰	۳۵

جدول ۳- توالی پرایمرهای مورد استفاده در تحقیق


Gene bank	Reverse primer	Forward primer	ژن
Slc9a1	GCTGGCAAACCTCCTCAAAG	CACATCAATGAGCTGCTGC	NHE1
Slc4a4	CATGGTAGGACTTGGCTTC	ACTCCCTTCATTGCCTTG	NBC1
18s	GTTGGTTTCGGAAGTGGC	GTC GGC ATC GTT TAT GGT CG	18S

جدول ۴- اجزای PCR جهت تکثیر ژن


Product	Syber mix(µl)	Primers(µl)	Taq-polymerase(µl)	cDNA (µl)	ddH2O(µl)
NHE1	۱۲/۰	۰/۰	۰/۱۵	۲	۹
NBC1	۱۲/۰	۰/۰	۰/۱۵	۲	۹
18S	۱۲/۰	۰/۰	۰/۱۵	۲	۹

جدول ۵- مشخصات آنتروپومتریک و متابولیک گروههای تحقیق


تمرين دیابتی	کنترل دیابتی	کنترل سالم	گروهها
**۲۹۱/۱۷ ± ۲۵/۲۱	۳۳۱/۷ ± ۱۸/۱۴ *	۲۹۹/۷ ± ۳۰/۸†	وزن (g)
۳۰۱/۷ ± ۴۷/۹۵ *,†	۳۹۴/۴۴ ± ۴۸/۷۴ *	۱۰۶/۴ ± ۹/۲۶ †	گلوکز (ng/dl)
۸/۹۵ ± ۰/۷۸ *,†	۱۰/۵۵ ± ۱/۱۲*	۶/۲۵ ± ۱/۱۵ †	انسولین (μ U/ml)
۶/۶۸ ± ۱/۳۱ *,†	۱۰/۴۸ ± ۱/۴۴ *	۱/۶۲ ± ۰/۲۴†	HOMA شاخص

* اختلاف معنی دار با گروه کنترل سالم ($P<0.05$)† اختلاف معنی دار با گروه کنترل دیابتی ($P<0.05$), [کنترل سالم (n=۷)، دیابتی (n=۹)، تمرين دیابتی (n=۹)]* اختلاف معنی دار گروه کنترل دیابتی با سایر گروهها ($P<0.05$), [کنترل سالم (n=۷)، دیابتی (n=۹)، تمرين دیابتی (n=۹)]

شکل ۱- تغییرات وزن بدن در گروههای مختلف تحقیق


* اختلاف معنی دار با گروه کنترل سالم ($P<0.05$), † اختلاف معنی دار با گروه کنترل دیابتی ($P<0.05$)

شکل ۲- تغییرات گلوکز پلاسمایا قبل و بعد از پروتکل تمرينی




* اختلاف معنی دار با گروه کنترل سالم ($P<0.05$)، † اختلاف معنی دار با گروه کنترل دیابتی ($P<0.05$)

شکل ۳- نمودار تغییرات انسولین پلاسمای ir-homa index



* اختلاف معنی دار ($P<0.05$), کنترل سالم ($n=6$), کنترل دیابتی ($n=6$), تمرینی دیابتی ($n=6$)

شکل ۴- میزان بیان ژن NHE1 در عضله قلبی گروههای تحقیق



* اختلاف معنی دار ($P<0.05$), کنترل سالم ($n=6$), کنترل دیابتی ($n=6$), تمرینی دیابتی ($n=6$)

شکل ۵- میزان بیان ژن NBC1 در عضله قلبی گروههای تحقیق

بحث و نتیجه‌گیری

تزریق استرپتوزوتوسین پس از ۸ هفته تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل ندارد [۱۲، ۱۳]. در تحقیق حاضر کاهش قابل توجه در بیان ژن mRNA NHE1 و NBC1 در عضلات قلب گروه کنترل دیابتی دیده شد. میزان کاهش بیان mRNA (NHE1) و mRNA (NBC1) به ترتیب ۲۵ و ۱۹ درصد بود (شکل ۴ و ۵). در پاسخ به تمرین استقاماتی بیان mRNA (NHE1) و mRNA (NBC1) در گروه تمرینی دیابتی تا حدود سطوح نرمال افزایش پیدا کرد هر چند تمایل به پایین بودن آن در گروه تمرین کرده دیابتی حفظ شد. این نتایج با نتایج تحقیق نیکویی و همکاران که اثر تمرینات استقاماتی بر بیان ژن و محتوای پروتئینی MCT1 و MCT4 در عضلات اسکلتی رت‌های دیابتی و سالم مورد ارزیابی قرار دادند، هم راستا می‌باشد که نشان دادند تمرین استقاماتی بیان ژن‌ها و محتوای پروتئینی MCT1 و MCT4 را در گروه تمرینی دیابتی و سالم افزایش داده است [۱۸]. در تحقیق مشابه Darmellah و همکاران نتایج متناقضی به دست آورده‌اند. آنها نشان دادند که فعالیت NHE1 در عضله قلب رت‌های (GK)^۱ مدل دیابتی نوع ۲ افزایش یافته است و این افزایش فعالیت بدون تغییر در محتوی پروتئینی این مبادله‌گر رخ داده است [۸]. افزایش بیان ژن mRNA (NHE1) نیز در عروق رت‌های دیابتی توسط Jandeleit و همکاران تایید شد، که با یافته‌های تحقیق حاضر همسو نمی‌باشد [۱۷]. در تحقیق DiGkr Sandmann و همکاران گزارش کردن که در اثر انسداد عروق کرونری قلب (اسیدوز) بیان ژن و پروتئین هر دو مبادله‌گر و انتقال دهنده NHE1 و NBC1 افزایش پیدا می‌کند. دلایل این اختلاف را می‌توان در روش ایجاد مدل دیابتی و مدت اعمال پروتکل و روش تمرینی استفاده شده در تحقیق حاضر جستجو کرد [۱۶].

کاهش بیان ژن مبادله‌گر و انتقال دهنده NHE1 و NBC1 در گروه کنترل دیابتی و افزایش بیان آنها در گروه تمرین کرده دیابتی در تحقیق حاضر حاکی از غلبه کردن اثرات تمرین استقاماتی بر دیگر متغیرهای درگیر در شرایط دیابت است. بیان mRNA (NHE1) در پاسخ به تمرین استقاماتی (درصد کاهش) بیشتر از بیان mRNA (NBC1) (درصد کاهش) در عضله قلبی گروه تمرین کرده دیابتی بود

کنترل و تنظیم pH سلول قلب جهت حفظ انقباض‌های مکرر عضلانی و جلوگیری از آسیب در حین فعالیت‌های ورزشی و همچنین در شرایط پاتو فیزیولوژیکی دیابت نوع ۲ از اهمیت خاصی برخوردار است. در مطالعه حاضر مدل دیابت نوع ۲ و تمرین استقاماتی به عنوان شرایط ایجاد کننده اسیدوز مورد استفاده قرار گرفتند تا بیان ژن‌های mRNA (NHE1) و NBC1 را مورد ارزیابی قرار دهند. تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که اثرات بلند مدت تمرین استقاماتی را بر بیان ژن‌های mRNA (NHE1) و NBC1 در عضله قلب رت‌های دیابتی، مورد بررسی قرار می‌دهد. تغییرات وزن (شکل ۱)، گلوکز خون (شکل ۲)، سطح انسولین و شاخص مقاومت به انسولین HOMA-IR index در گروه‌های دیابتی همگی دلالت بر این داشت که مدل دیابتی نوع ۲ به درستی اعمال گردیده است (شکل ۳). مهمترین یافته‌های تحقیق این است که بیان ژن mRNA (NHE1) و NBC1 در شرایط دیابت نوع ۲ نسبت به شرایط طبیعی کاهش می‌یابد و تمرین استقاماتی می‌تواند از کاهش بیان ژن mRNA (NHE1) و NBC1 در عضله قلب جلوگیری نماید. مطالعه تغییرات NHE1 و NBC1 در عضله قلب فقط به تعدادی تحقیق در زمینه فعالیت و بیان پروتئین محدود می‌شود و در زمینه بیان ژن این انتقال دهنده‌ها در شرایط دیابت نوع ۲ و اثر تمرین بر روی آن تحقیقات محدودی صورت گرفته است. مطالعه حاضر نشان داد که کاهش بیان ژن‌های mRNA (NHE1) و NBC1 در گروه کنترل دیابتی دلالت بر این دارد که بیان ژن این انتقال دهنده‌ها نیز تحت تاثیر تغییرات متابولیکی قرار می‌گیرد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که پاسخ انتقال دهنده‌های غشایی به شرایط اسیدوز ناشی از تمرین و دیابت نوع ۲ متفاوت می‌باشد و اطلاعات در این زمینه ضد و نقیض و واپسی به سطح فعالیت، محتوی پروتئین و بیان ژن می‌باشد. در همین راستا Prigent و همکاران نشان دادند فعالیت مبادله‌گر NHE1 در عضله قلب رت‌های دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین کاهش می‌یابد. هر چند این کاهش فعالیت NHE1 ممکن است به علت کاهش بیان ژن آن در شرایط دیابت نوع ۲ باشد اما Pierce و همکاران نشان دادند بیان ژن mRNA (NHE1) عضله قلب گروه دیابتی ناشی از

1. Goto-Kakizaki

همکاران، Darmella، و همکاران و دیگر محققین موید این موضوع می‌باشد [۸،۱۲]. از طرف دیگر تغییرات متابولیکی نیز می‌توانند به عنوان عوامل موثر پس ترجمه‌ای در کاهش بیان این انتقال دهنده‌ها باشد. Lagadic-Gossmann و همکاران گزارش کردند که افزایش شیب سدیم Na^+ درون سلولی در رت‌های دیابتی، از جمله عواملی است که به کاهش فعالیت مبادله‌گر NHE1 در عضله قلب منجر می‌شود [۲۸]. به علاوه نتایج تحقیق Grinstein و همکاران نشان داد که افزایش سدیم درون سلولی می‌تواند یک نقش مهاری از طریق رقابت با پروتون در اتصال به جایگاه درون سلولی مبادله‌گر NHE1 داشته باشد [۲۹]. همچنین در تحقیق دیگر Pierce و همکاران گزارش کردند میل ترکیبی مبادله‌گر NHE1 به پروتون در شرایط دیابت نوع ۲ کاهش می‌یابد [۳۰]. تغییر در کنترل کلسیم درون سلولی از جمله سازوکارهای دیگر مسئول کاهش فعالیت مبادله‌گر NHE1 در عضله قلبی دیابتی است. در تحقیق دیگر Bertrand و همکاران دو مسیر درون سلولی را برای کنترل فعالیت NHE1 از طریق کلسیم پیشنهاد دادند. مسیر اول از طریق پیوند مستقیم کلسیم/کالمودلین (CAM)^۱ به مبادله‌گر و مسیر دوم فسفوریلاسیون مبادله‌گر بوسیله کلسیم/کالمودلین وابسته به پروتئین کیناز^۲ می‌باشد [۳۱]. Lagadic-Gossmann و همکاران نشان دادند که کاهش کلسیم درون سلولی ناشی از دیابت نوع ۲ موجب کاهش فعالیت مبادله‌گر NHE1 می‌شود [۳۲]. علاوه بر این همچنین Juel و همکاران نشان دادند که فعالیت NBC1 در شرایط دیابت نوع ۲ با شرایط کنترل سالم تفاوتی ندارد [۱۰].

سازوکارهایی که از طریق آن تمرين استقامتی موجب افزایش بیان ژن مبادله‌گر و انتقال دهنده NHE1 و NBC1 می‌شود غشای سلول قلبی می‌گردد تا کنون به خوبی مشخص نشده است اما چندین عامل جهت ایجاد این تغییرات توسط محققین پیشنهاد شده است که شامل کلسیم، توسعه محاسباتی می‌باشد [۱۰]. تمرين استقامتی موجب آزادسازی کلسیم درون سلولی می‌گردد و

(شکل ۴ و ۵). دلایل این افزایش را می‌توان به خصوصیات اکسیداتیوی عضله قلبی از یک طرف و همچنین شدت و نوع تمرين (استقامتی) از طرف دیگر نسبت داد. در تایید این فرضیه Rasmussen و همکاران نشان دادند که یک جلسه تمرين سرعتی موجب افزایش معنی‌دار در بیان mRNA NHE1 (NHE1) عضلات اسکلتی رت می‌شود. آنها همچنین گزارش کردند که سه هفته تمرين استقامتی موجب افزایش معنی‌داری در بیان mRNA NHE1 در عضلات اسکلتی کند می‌گردد اما این افزایش در سطح پروتئین NHE1 در عضلات اسکلتی معنی‌دار نبود [۲۲]. همچنین Claire و همکاران اثر تمرينات ایترووال شدید بر محتوى پروتئینی MCT1 و MCT4 و NBC را مورد ارزیابی قرار دادند و افزایش محتوى پروتئینی MCT1 در تارهای کند را نشان دادند. از طرف NBC در تارهای کند نسبت به تند را نشان دادند. از طرف دیگر افزایش میزان بیان mRNA NHE1 نسبت به mRNA NBC1 در عضله قلب دیابتی را می‌توان به نحوه توزیع و کنتیک فعالیت این انتقال دهنده‌ها در بافت‌های مختلف نسبت داد [۲۱]. و همکاران نشان دادند که مشارکت مبادله‌گر و انتقال دهنده NBC1 و NHE1 در خارج ساختن پروتون H^+ از سلول قلب در $\text{pH}=6/90$ به ترتیب ۶۹ و ۳۱ درصد است [۱۴]. در همین راستا Juel و همکاران در یک تحقیق اثر تمرين با شدت زیاد بر محتوى NHE1 عضلات کند و تند رت‌ها را مورد بررسی قرار دادند و نشان داده شد که ایزوفرم NHE1 در عضلات بیان می‌شود و همچنین تمرين با شدت زیاد موجب افزایش محتوى این انتقال دهنده به میزان ۳۶ و ۲۹ درصد به ترتیب در تارهای گلیکولیتیکی و اکسیداتیوی می‌شود [۲۳]. در نتیجه افزایش بیان mRNA NBC1 نسبت به (NBC1) در عضله قلب با توجه به خصوصیات اکسیداتیوی این عضله و از طرف دیگر شدت تمرين استقامتی به کار رفته در این تحقیق منطقی به نظر می‌رسد. سازوکارهای که از طریق آن دیابت موجب کاهش بیان ژن مبادله‌گر و هم انتقال دهنده NBC1 می‌شود به خوبی مشخص نشده است اما اختلاف بین بیان ژن و پروتئین نشان دهنده تاثیر متغیرهای مداخله‌گر پس ترجمه‌ای بر کنترل سترز پروتئین می‌باشد. نتایج تحقیق Prigent و

1. $\text{Ca}^+/\text{calmodulin}$

2. Mitogen- activated protein kinases

3. Mitogen- activated protein kinases

4. Gosmanow,A and et al

5. Protein kinase C

سپاسگزاری

نویسنده‌گان بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (رباست جمهوری) به جهت حمایت مالی از تحقیق حاضر، شرکت دام و طیور کانی دام و مرکز تحقیقات بیو لوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رازی کرمانشاه به جهت همکاری در اجرای تحقیق ابراز می‌دارند.

کلسیم از طریق فعال کردن چندین سازوکار به تغییرات در سطح mRNA و پروتئین ترانسپورترهای غشایی کمک می‌کند [۱۰]. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که بیان ژن در گروه کنترل دیابتی کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد و تمرين استقامتی می‌تواند این کاهش بیان را جبران و به سطوح نرمال نزدیک کند. همچنین الگوی بیان، مختص ھر ژن و نقش متابولیکی آن در بافت مورد نظر دارد.

مأخذ

- Fligell L. molecular biology of the myocardial Na/H exchanger. *Journal of Molecular and Cellular Cardiology* 2008; 44: 228–237.
- Danielle F. The regulation of intracellular pH in the diabetic myocardium. *Cardiovascular Research* 1997; 34: 48-54.
- Claire T and David B. Effect of High- Intensity Training on MCT1,MCT4 and NBC Expressions in Rat Skeletal Muscles:Influwnce of Chronic Metabolic Alkalosis. *Am J Physiol Endocrinol Metabol* 2007; 293: E916-E922.
- Juel C. Muscle pH regulation: role of training. *Acta Physiol Scand* 1998; 162: 359-366
- Vennetta R. Danes. Effect of exercise training on myocyte pH_i regulation. National library of Canada. simon fraser university 1996.
- Orchard CH, Kentish JC. Effects of changes in pH on the contractilefunction of cardiac muscle. *Am J Physiol* 1990; 258:C967-C981.
- Van ZD. Diagnosis and Treatment of Diabetic Ketoacidosis. *SA FAMPAC* 2008; 50: 35-40.
- Darmella D. Enhanced activity of myocardial na/h exchanger contribute to left ventricular hypertrophy in GOTO-KAKIZAKI rat model of type 2 diabetes: *critical role of Akt diabetologia* 2007; 50:1335-1344.
- Juel C. Regulation of PH in Human Skeletal Muscle: Adaptaion to Physical Activity. *Acta Physiol* 2008; 193: 17-24
- Juel C. Training-induced changes in membrane transport proteins of humanskeletal muscle. *Eur J Appl Physiol* 2006; 96: 627–635.
- Charles TP, Norman L, George N, Heigenhauser JF. Effects of short-term training on plasma acid-base balance during incremental exercise in man. *Physiol* 2003; 55: 585–603.
- Le Prigent K, Lagadic-Gossmann D, Feuvray D. Modulation byextracellular pH and intracellular calcium of Na/H exchange in diabetic rat isolated ventricular myocytes. *Circ Res* 1997; 80: 253–260.
- Pierce GN, Slotin T, Fliegel L, Gilchrist JSC, Maddaford TG. Expression and activity of the sodium-hydrogen exchanger in cardiac sarcolemma in health and disease. In: Fliegel L, ed. TheNa/H Exchanger. Heidelberg: Springer-Verlag 1996; 217–228.
- Le Prigent K, Lagadic-Gossmann D, Feuvray D. Na-HCO₃ symport activity in diabetic ventricular myocytes. *J Mol Cell Cardiol* 1996; 28:A67.
- Gan XT, Chakrabarti S, Karmazyn M. Modulation of Na⁺/H⁺ exchangeisoform 1 mRNA expression in isolated rat hearts. *Am J Physiol* 1999; 277: H993–8.
- Sandmann S, Yu M, Kaschina E, Blume A, Bouzinova E, Aalkjaer C, et al. Differential effects of angiotensin AT1 and AT2 receptors on theexpression, translation and function of the Na⁺-H⁺ exchanger and Na⁺-HCO₃ – symporter in the rat heart after myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37:2154–65.
- Jandeleit-Dahm K, Hannan KM, Farrelly CA, Allen TJ, Rumble JR, Gilbert RE, et al. Diabetes-induced vascular hypertrophy is accompaniedby activation of Na⁽⁺⁾-H⁽⁺⁾ exchange and prevented by Na⁽⁺⁾-H⁽⁺⁾ exchange inhibition. *Circ Res* 2000; 87:1133–40.
- نیکویی، روح الله؛ رجبی، حمید؛ قراخانلو، رضا؛ منظمی، امیرعباس؛ امیدفر، کبری؛ لاریجانی، باقر و همکاران. تعديل کاهش بیان ژن MCT1 و MCT4 در عضلات اسکلتی رت‌های دیابتی نوع ۲ متعاقب تمرين استقامتی. مجله دیابت و لیپید ایران ۱۳۸۹؛ (۳): ۲۴۱-۲۵۱.
- Baker S, KARL J A. MCCULLAGH, AND BONEN A. Training intensity-dependent and tissue-specific increasesin lactate uptake and MCT-1 in heart and muscle. *J Appl Physiol* 1998; 84:987-994.
- Juel C, Mads KH and Dela F. Effect of Strength Training on Muscle Lactate Release and MCT1 and MCT4 Content in Healthy and Type 2 Diabetic Humans. *J Physiol* 2004; 55:297-304.
- Claire T and David B. Effect of High- Intensity Training on MCT1, MCT4 and NBC Expressions in Rat Skeletal Muscles: Influwnce of Chronic Metabolic Alkalosis. *Am J Physiol Endocrinol Metabol* 2007; 293: E916-E922.
- Rasmussen M, Juel C and Nordsborg B. Exercise-induced regulation of muscular Na⁻K⁻ pump, FXYD1, and NHE1mRNA and protein expression: importance of training status,

- intensity, and muscle type. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2011; 300:R1209-R1220.
23. Juel C. Expression of the Na/H Exchanger Isoform NHE1 in Skeletal Muscle and Effect of Training. *Acta Physiol Scand* 2000; 170:59-63.
 24. Viswanad KB, Lydia A, Ramarao P. Combination of High-Fat-Diet-Fed and Low-Dose Streptocin-Treated Rat: A Model for Type 2 Diabetes and Pharmacological Screening Srinivasan. *Pharmacological Research* 2005; 52: 313-32.
 25. Brooks GA, White TP. Determination of metabolic and heart rat responses of rats to treadmill exercise. *J Appl Physiol* 1978; 45: 1009-1015.
 26. Norten A. Running speed and maximal oxygen uptake in rats and mice: practical implications for exercise training. *EUR SOCIETY OF CARDIOLOGY* 2007; 14: 753-760.
 27. Sharma AK, Srinivasan BP. Triple verses glimepiride plus metformin therapy on cardiovascular risk biomarkers and diabetic cardiomyopathy in insulin resistance type 2 diabetes mellitus rats. *European Journal of Pharmaceutical Sciences* 2009; 38: 433-444.
 28. Lagadic-Gossmann D, Feuvray D. Intracellular sodium activity in papillary muscle from diabetic rat hearts. *Exp Physiol* 1991; 76: 147-149.
 29. Grinstein S, Goetz JD, Rosthstein A. 23Naq fluxes in thymiclymphocytes. II. Amiloride sensitive NaqrHq exchange pathway: reversibility of transport and asymmetry of the modifier site. *J Gen Physiol* 1984; 84:585-600.
 30. Pierce GN, Ramjiawan B, Dhalla NS, Ferrari R. NaHexchange incardiac sarcolemmal vesicles isolated from diabetic rats. *Am J Physiol* 1990; 258: H255-H261.
 31. Bertrand B, Wakabayashi S, Ikeda T, Pouyssegur J, Shigekawa M. The NaH exchanger isoform NHE 1 is a novel member of thecalmodulin-binding proteins. Identification and characterization ofcalmodulin-binding sites. *J Biol Chem* 1994; 269: 13703-13709.
 32. Lagadic-Gossmann D, Buckler KJ, Le Prigent K, Feuvray D. AlteredCa2 handling in ventricular myocytes isolated from diabetic rats. *Am J Physiol* 1996; 270: H1529-H1537.